

Vaš partner u proizvodnji



2024

*Health for all,
Hunger for none*



Vaš Bayer

UVOD

Poštovani proizvođači, dragi partneri i kolege,

Jedna vrlo izazovna proizvodna godina je iza nas. Rano u proljeće imali smo jaku zarazu sa žutom hrđom u pšenici što se na kraju odrazilo na visinu i kvalitetu prinosa ove kulture. Suočili smo se s poplavama, olujama, tućom što je uvelike utjecalo na sjetvu, rast i razvoj proljetnih kultura. Uz sve to i razni događaji u našem okruženju, Europi i svijetu, diktiraju cijenu energenata, repromaterijala i merkantile, ali i utječu na distribuciju i opskrbu hranom.

U takvim okvirima važnost proizvodnje hrane više nego ikad dolazi do izražaja.

Kako bi bili uspješni u poljoprivrednoj proizvodnji morate biti spremni odgovoriti na brojne izazove i zahtjeve koji su pred vama, a to su, uz ekstremne vremenske prilike kao posljedica klimatskih promjena, i borba protiv rezistentnosti sve većeg broja korova, štetnika i bolesti na različite skupine sredstava za zaštitu bilja kao i ispunjavanje sve većih zahtjeva u pogledu sigurnosti hrane te očuvanja tla i okoliša.

Zato je važno imati informacije u pravo vrijeme, potrebno je više znanja i važno je odabrati i koristiti odgovarajuće proizvode i usluge koji će vam omogućiti da dođete do cilja i budete prije svega profitabilni.

Bayer vam na tom putu kroz pomno odabrane hibride za naše tržište, širok izbor učinkovitih proizvoda za zaštitu bilja, inovacije i digitalna rješenja koja će vam pomoći u praćenju usjeva i optimalizaciji troškova proizvodnje te iskustvo i stručnost svojeg tima nudi partnerstvo i potrebne alate da odgovorite na sve izazove koji su pred vama te da na kraju proizvodnog ciklusa budete uspješni, zadovoljni i ostvarite profit.

U ovom katalogu možete naći sve potrebne informacije o našim proizvodima u 2024. godini, hibridima kukuruza i sredstvima za zaštitu bilja, kao i informacije o aktivnostima i projektima koje provodimo na hrvatskom tržištu.

Želimo vam uspješnu sezonu uz Bayer proizvode u 2024. godini!

SADRŽAJ

Poglavlje 1 - DEKALB® hibridi

ZAŠTO JE DEKALB® VIŠE OD SJEMENA.....	6
NAŠE ULAGANJE U VAŠU PROIZVODNJU.....	8
KLJUČNE PREDNOSTI DEKALB® HIBRIDA.....	10
SNAGA GUSTOĆE.....	12
ACCELERON® TEHNOLOGIJA TRETMANA SJEMENA ZA PUNI POTENCIJAL DEKALB® HIBRIDA.....	14
FIELD SHIELD - VRHUNSKI PRINOS I VISOKA TOLERANCIJA NA STRES.....	16
ODREDITE POTENCIJAL ZEMLJIŠTA I POBOLJŠAJTE PRINOS POLJA.....	18
PRAVA GUSTOĆA, MAKSIMALAN PRINOS.....	19
PRAVI HIBRIDI ZA SVAKO POLJE I GUSTOĆU.....	20
POVEĆAJTE PROFIT UZ HIBRID-PO-HIBRID PREPORUKAMA.....	21
DEKALB® TEHNOLOŠKI CENTRI.....	22
ODABIR HIBRIDA ZA TRŽIŠTE - FACT POKUSI.....	24
SJEMENSKA PROIZVODNJA.....	26
PORTFOLIO DEKALB® HIBRIDA.....	28

Poglavlje 2 - Sredstva za zaštitu bilja

ZAŠTITA KUKURUZA.....	48
BORBA PROTIV REZISTENTNIH KOROVA.....	50
ZAŠTITA ŽITARICA OD KOROVA.....	52
STRATEGIJA ZAŠTITE PŠENICE OD BOLESTI.....	54
STRATEGIJA ZAŠTITE JEĆMA OD BOLESTI.....	56
SVE ŠTO TREBATE ZNATI O ZAŠТИTI ŽITARICA OD BOLESTI.....	58
ZAŠTITA ULJANE REPICE.....	60
ZAŠTITA KRIMPIRA OD KOROVA I BOLESTI.....	62
PREGLED PROIZVODA.....	64
HERBICIDI.....	66
FUNGICIDI.....	80
INSEKTICIDI.....	90
BIOLOŠKI PROIZVODI.....	92

ZA STRUČNU PODRŠKU OBRATITE SE BAYEROVIM PREDSTAVNICIMA NA TERENU



www.cropscience.bayer.hr
Bayer Crop Science Hrvatska



ZAŠTO JE DEKALB® VIŠE OD SJEMENA?

Vaš posao počinje puno prije sjetve.
I ne završava se nakon nje.

Zbog toga vam **DEKALB®** osigurava kompletno rješenje
koje zaista pravi razliku.

Pružamo vam naprednu genetiku koja je prilagođena
vašim potrebama. Donosimo inovativne i efikasne
proizvode za zaštitu usjeva i tretman sjemena.

Naša sveobuhvatna ponuda će vam omogućiti da
maksimalno iskoristite svoju investiciju.



Mi smo **DEKALB®**.

Uvjerite se u

#DEKALB® razliku

#DEKALB®razlika temelji se na sveobuhvatnom
paketu kojeg podupiru tri esencijalna koraka:

01

UČINAK

Nudimo vam širok portfolio vrhunskih
hibrida s visokim performansama,
prilagođenim uvjetima za naš dio regije.

02

ZAŠTITA

Štitimo vaše ulaganje u sjeme - u vreći
i izvan nje - tijekom čitave proizvodnje
kukuruza.

03

PARTNERSTVO


Mi smo više od dobavljača. Mi smo vaši partneri.
Podržavamo vaše odluke digitalnim podacima
i stručnim savjetima koji će vam pomoći u
proizvodnji te nagrađujemo vašu lojalnost.

NAŠE ULAGANJE U VAŠU PROIZVODNJU

Zaslužujete da su vam uvijek dostupna najbolja i inovativna rješenja odnosno proizvodi. Zbog toga ulažemo maksimalne napore i investicije u istraživanje i razvoj.

Kada su u pitanju hibridi, u našim istraživanjima smo fokusirani na to da vam ponudimo najveći potencijal prinosa u kombinaciji s najboljom otpornošću na štetu od štetnika, bolesti i klimatskih promjena.


Također, konstantno nastojimo unaprijediti kvalitetu kako bismo zadovoljili zahtjeve i vrijednosti lanca hrane i poboljšali upravljanje ulaganjima za **održivu poljoprivredu**.



Više od
2 milijarde eura u investicijama



Više od
20 centara za istraživanje i razvoj



Približno
8.000 zaposlenih u istraživanju i razvoju



Više od
50 država

DEKALB® precizno oplemenjivanje: Pronalaženje i selekcija najboljeg.

Da bismo vam osigurali najprinosnije i najotpornije hibride kombiniramo naš genetski materijal te uz pomoć umjetne inteligencije i velikog broja pokusa donosimo zaključke.

Nastavljamo ispitivanja u laboratorijima, gdje već 15 godina koristimo genetske markere s fenotipovima. Nakon toga se fokusiramo na linije koje najviše obećavaju i upravo njih testiramo na terenu, odakle dobivamo bolje informacije o gustoći sjetve.

Zahvaljujući novim metodama, **DEKALB®** danas brže i kvalitetnije identificira nove hibride za uspješnu proizvodnju.

Precizno oplemenjivanje podrazumijeva ulaganje u znanost o podacima, automatizaciju i naprednu tehnologiju markera



Baza genetskog materijala rukovođena umjetnom inteligencijom



Genotip svakog sjemena



Zaštićen usjev



Automatizirana dorada sjemena



Kontrolirani eksperimenti na poljima



Snimanje na polju



Globalno povezana žetva



KLJUČNE PREDNOSTI DEKALB® HIBRIDA



**PREPORUČENI SKLOP I RAZMAK
U REDU PRI SJETVI KUKURUZA NA
RAZMAK IZMEĐU REDOVA 70 I 75 CM**

Željeni sklop u berbi biljaka/ha	Razmak između redova	
	70 cm	75 cm
	Razmak unutar reda u cm	
62000	23,0	21,5
63000	22,7	21,2
64000	22,3	20,8
65000	22,0	20,5
66000	21,6	20,2
67000	21,3	19,9
68000	21,0	19,6
69000	20,7	19,3
70000	20,4	19,1
71000	20,1	18,8
72000	19,8	18,5
73000	19,6	18,3
74000	19,3	18,0
75000	19,0	17,8
76000	18,8	17,5
77000	18,5	17,3
78000	18,3	17,1
79000	18,1	16,9
80000	17,9	16,7
81000	17,6	16,5
82000	17,4	16,3
83000	17,2	16,1
84000	17,0	15,9
85000	16,8	15,7


SNAGA GUSTOĆE

POVEĆAJTE PRINOS DO

DODATNIH 1 t/ha*

uz naše preporuke gustoće sjetve koje odgovaraju vašem zemljištu.

*Izvor: DEKALB® tehnološki centar, Bayer interna ispitivanja, Europa, 2018. Poravnanje između standardne regionalne gustoće i DEKALB® preporuke za sjetvu. Sve informacije koje se odnose na proizvode koje Bayer ili njegovi zaposlenici ili predstavnici daju u usmenom ili pismenom obliku, uključujući informacije u ovom priručniku, dani su u dobroj namjeri, ali se ne mogu smatrati garancijom od strane Bayera u vidu upotrebe ili prikladnosti proizvoda, s obzirom da to može ovisiti o lokalnim klimatskim uvjetima i drugim faktorima. Bayer ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ove informacije nisu dio bilo kojeg ugovora s Bayerom, osim ako u pisanim oblicima nije navedeno drugačije.



Uvjerite se u razliku s **DEKALB®** hibridima i potražite preporuku za svoja polja od naših prodajnih predstavnika.




ACCELERON TEHNOLOGIJA TRETMANA SJEMENA ZA PUNI POTENCIJAL DEKALB® HIBRIDA

DEKALB® hibridi dokazano donose profit. Zaštitite sjeme od bolesti i insekata koji se javljaju na početku sezone tako što ćete osnažiti korijen i na taj način osigurati maksimalne prinose.

Sjeme tretirano rješenjima na osnovi ACCELERON tehnologije ima široku namjenu: štiti vaše usjeve tijekom prvih mjeseci i više dana, unapređuje kondiciju biljke u ranoj sezoni i osigurava bolji vigor i ujednačenost usjeva.

Kada posijete **DEKALB®** hibride tretirane Acceleron® rješenjima u preporučenoj gustoći sjetve, prinos će dostići svoj maksimum, a vi nećete imati puno razloga za brigu.



ZAŠTITA I MAKSIMIZACIJA OD POČETKA

Novo oblaganje sjemena

Poboljšava sipljivost sjemena

Biostimulator

Pojačava apsorpciju vode i nutrijenata – povećavajući funkcionalni obujam korijena

Fungicid

Zaštita od bolesti i insekata – osigurava početni porast biljke


Insekticid

IZABERITE NAJBOLJE RJEŠENJE ZA SVOJE POTREBE

ACCELERON® STANDARD	ACCELERON® ELITE

UZ POMOĆ BIOSTIMULATORA DO MAKSIMALNOG POTENCIJALA PRINOSA

① PRESIMBIOTSKE INTERAKCIJE




B-360 sadrži molekulu LCO (lipohit oligosaharid), koja je ključni element simbiotske povezanosti korijena biljke i mikoriznih gljivica.

B-360 djeluje na 2 načina:

1. šalje signal biljci koja otvara stanice korijena mikoriznim gljivicama.
2. stimulira klijanje spora mikoriznih gljivica, stvarajući hife gljivici.

② USPOSTAVLJANJE MIKORIZNE SIMBIOZE



Mikorizne gljivice zatim mogu ući u stanice korijena, započeti kolonizaciju i povezati se s ostatkom korijena biljke.

③ VEĆI FUNKCIONALNI VOLUMEN KORIJENA



Funkcionalni volumen korijena (biljni korijen + mikorizne gljivice) se povećava, tako da biljka ima pristup većoj površini zemljišta, kao i hranljivim sastojcima i vodi koja do tad nije bila dostupna.

+2%*
Dodatnog prihoda
u prosjeku

*na osnovu 43 testiranja mikroparcela - 6 odgovora po tretmanu - 2017 - EU.

VRHUNSKI PRINOS I VISOKA TOLERANCIJA NA STRES

Visok potencijal prinosa je dobar, a još je bolji u kombinaciji s visokom tolerancijom na stres. Rezultat toga je stabilan i optimalan prinos u svim mogućim uvjetima.

FIELD SHIELD podrazumijeva oboje. U pitanju je poseban portfolio genetski naprednih hibrida koji kombiniraju visoku toleranciju na biotičke i abiotičke faktore stresa s vrhunskim potencijalom prinosa.

Ove hibride prate inovativni proizvodi za tretiranje sjemena koji štite vaš usjev od sjetve.



Stabilnost prinosa



Prinos



Dobre agronomске
osobine



KLJUČNI ELEMENTI ZA FIELD SHIELD



IZABRANI HIBRID

Genetski visok potencijal za prinos i visoka tolerancija na stres



ACCELERON

Zaštita na početku/
poboljšanje



PODRŠKA PROIZVODNJI

Podrška pri odabiru i pozicioniranju hibrida u proizvodnji usjeva od sjetve do žetve kroz podršku naših stručnih predstavnika.

KAKO ODABIREMO FIELD SHIELD PORTFOLIO?

GLAVNI RIZICI U ODREĐENOM PODRUČJU

Procjenjujemo grupu **ključnih rizika** po područjima.



PORTFOLIO DEKALB SHIELD SJEMENA

Mi **analiziramo podatke** da bismo pronašli najbolji portfolio za ove ključne rizike.
Podaci se dobivaju iz sljedećeg:
// Pokusa iz procesa
oplemenjivanje
// Pokusa sektora za razvoj
tržista
// Pokusa fitopatologije



Zatim možemo identificirati hibride s **najboljom tolerancijom** na rizike u području i najboljim potencijalom za proizvodnju u dobrim uvjetima.



KRITERIJI ZA ODABIR PORTFOLIA


KRITERIJI	OPIS
Prinos tijekom suše	Razina prinosa u tijeku suše
Prinos tijekom toplinskog stresa	Sposobnost podnošenja toplinskog stresa
Prinos pri niskoj gustoći	Fleksibilnost klipa - sposobnost postizanja učinka pri niskoj gustoći
Prinos pri niskim inputima	Sposobnost davanja prinosa u sredinama s niskim potencijalom prinosa
Stabilnost prinosa	Prilagodljivost - sposobnost davanja prinosa u različitim uvjetima tijekom godina
Potencijal prinosa	Ukupna ocjena učinka, potencijal proizvodnje prinosa u normalnim uvjetima
Ocjena ranog vigora	Uobičajeni rast tijekom hladnijeg proljeća

ODREDITE POTENCIJAL ZEMLJIŠTA I POBOLJŠAJTE PRINOS POLJA

Kolika je plodnost vašeg zemljišta, kolika je njegova sposobnost da poveća prinos? Procjena potencijala zemljišta je vitalna komponenta DEKALB® naprednih rješenja.

Svako polje ima potencijal prinosu koji ovisi o ključnim faktorima: zemljištu, vremenskim uvjetima i poljoprivrednoj praksi. Plodnost zemljišta je između ostalog uvjetovana organskim elementima, teksturom zemljišta i dostupnošću vode.

Sve ovo može varirati od polja do polja. Kombinacija ovih faktora predstavlja potencijal prinosu.



SAVRŠEN SPOJ UVJETA ZEMLJIŠTA I GUSTOĆA SJETVE


Kad je kukuruz u pitanju, morate voditi računa o gustoći biljaka kako biste maksimalno iskoristili svoj potencijal prinos. Da bismo odredili optimalnu gustoću sjetve, prvo moramo razumjeti potencijal prinosu svakog polja. Stvarajući precizne grafikone gustoća za naše hibride u različitim uvjetima i okruženjima, u DEKALB®-u smo u mogućnosti pronaći optimalnu gustoću sjetve za maksimalan prinos.



PRAVA GUSTOĆA, MAKSIMALAN PRINOS

Plodna zemljišta zahtijevaju veća ulaganja kako bi se maksimalno iskoristili dobri uvjeti. Kada zemljišta nemaju tako visok potencijal prinosu preporučujemo manju gustoću sjetve. To će umanjiti stres za biljku, smanjiti troškove i dovesti do boljih rezultata.

U svakom slučaju, ostvarit ćete maksimalne rezultate jer ste izabrali gustoću sjetve na temelju uvjeta zemljišta.



Prilagodite gustoću sjetve potencijalu vašeg zemljišta i na taj način ostvarite maksimalne prinose. Tako ćete ostvariti maksimalnu efikasnost i izbjegići stresne situacije za biljke.

Niska gustoća	Srednja gustoća	Visoka gustoća
Visoki potencijal zemljišta	Neiskorišteni potencijal	✓
Srednji potencijal zemljišta	Neiskorišteni potencijal	✓
Nizak potencijal zemljišta	✓	Visok stres za biljke



PRAVI HIBRIDI ZA SVAKO POLJE I GUSTOĆU

Različiti hibridi različito reagiraju na tipove zemljišta i gustoću sjetve, zbog čega gustoća sjetve ovisi o karakteristikama hibrida i uvjetima okruženja.


U **DEKALB®** tehnološkim centrima temeljito testiramo naše hibride u 6 različitim gustoća sjetve i u različitim prinosnim uvjetima. Prikupljamo na tisuće podataka kako bismo dobili grafikone gustoće za svaki **DEKALB®** hibrid. Na ovaj način možemo procjeniti kako naši hibridi reagiraju na različitim zemljištima i u različitim klimama te koja gustoća sjetve je u tim različitim uvjetima najbolja za njih.

Na temelju naših preporuka možete odrediti najbolju gustoću sjetve za hibride koje koristite u uvjetima u kojima se nalazi vaše zemljište. Tako će vaš prihod od prinosa biti maksimalan.

Prinos kukuruza ovisi o: broju klipova kukuruza po hektaru, redovima zrna po klipu, zrna po redu kao i o veličini zrna. Na njih utječe genetika, poljoprivredne prakse i okolina. Svaki hibrid različito reagira na svoje okruženje. Reakcija ovisi o mogućnosti povećanja klipa i sposobnosti ostvarivanja rezultata u zemljištima visoke gustoće sjetve.

- FLEX hibridi kukuruza mogu povećati veličinu klipa kao odgovor na nižu gustoću sjetve (plava linija).
- FIX hibridi kukuruza obično imaju veći prinos pri visokoj gustoći sjetve (žuta linija).


KAKO HIBRID REAGIRA NA GUSTOĆU SJETVE?



POVEĆAJTE PROFIT UZ HIBRID-PO-HIBRID PREPORUKAMA

ODABIR HIBRIDA

VISOKA TOLERANCIJA NA VISOKU GUSTOĆU




Hibrid 1 maks. profit na 8.3 biljaka/m²



Veličina klipa kukuruza ostaje stabilna kod različitih gustoća.

SREDNJA TOLERANCIJA NA VISOKU GUSTOĆU



Hibrid 2 maks. profit na 7.3 biljaka/m²



Što je veća gustoća viša varira i veličina klipa.

DEKALB® TEHNOLOŠKI CENTRI


OVDJE SE STVARAJU PREPORUKE ZA SJETVU

Svake sezone, četrdeset pet DEKALB® tehnološka centra diljem Europe provode ispitivanja na više od 1000 ha površine uz specifični DEKALB® protokol. Za svaki hibrid prikupi se više od 2.000 podataka. Podaci za hibride prikupljuju se na različitim uvjetima zemljišta pri različitim gustoćama sjetve kako bi se odredila njihova optimalna učinkovitost.

Zahvaljujući podacima prikupljenim u DEKALB® tehnološkim centrima, poljoprivrednici donose odluke temeljene na znanstvenim podacima kako bi optimizirali prinos za svaku parcelu i za svaki DEKALB® hibrid.

PRILAGOĐENE PREPORUKE S NOVOM RAZINOM PODATAKA

Podaci se izvode na osnovu više koraka.



ODABIR HIBRIDA ZA TRŽIŠTE

FACT POKUSI

(FIELD ADVANCEMENT CROP TRIALS)

Ovu vrstu pokusa doveli smo na hrvatsko tržište 2022. godine, a oni nam omogućuju da kroz testiranje i praćenje najnovije genetike odnosno najnovijih hibrida u našim lokalnim uvjetima zajedno s rezultatima pokusa iz drugih država u našem okruženju i šire, odaberemo hibride koji su se pokazali najboljima, najotpornijima i najstabilnijima i to prije nego što ih lansiramo na tržište.


Ovo su jedinstveni pokusi na hrvatskom tržištu i po njima se razlikujemo od svoje konkurenčije, a vama dragi proizvođači omogućujemo da budete sigurni u snagu naših hibrida i prije nego što ih isprobate u svojoj proizvodnji.

Zbog različitih proizvodnih uvjeta na istoku i zapadu naše zemlje FACT pokusi su uvijek postavljeni na dvije različite lokacije.



U 2023. godini jedan pokus je bio u Bolmanu na površinama tvrtke **Fermopromet d.o.o.**, a drugi u okolini Bjelovara na poljima **OPG Snježana Šolčić.**

2023. - 72 hibrida razvrstanih u 4 različite RM grupe



TESTIRAMO I NOVA DIGITALNA RJEŠENJA

CLIMATE
FIELDVIEW™

Uz pomoć našeg poslovnog partnera tvrtke **Fermopromet** krenuli smo s testiranjem i novih digitalnih rješenja što će vam u budućnosti omogućiti lakše i preciznije donošenja odluka u samoj proizvodnji. Omogućit će vam postizanje većih prinosa uz optimalizaciju proizvodnje s ciljem boljeg očuvanja tla, vode i okoliša.



Tvrta **Fermopromet d.o.o.** osnovana je 04.04.1990. godine te se nalazi u vlasništvu Huberta Kišpala. Osnovna djelatnost društva je poljoprivredna proizvodnja ratarskih kultura. Isto tako na području Hrvatske obrađuje se 3000 ha, Srbije 3000 ha i Mađarske 2000 ha površina. Društvo također posjeduje vlastite silose za skladištenje žitarica kapaciteta 100 000 t. Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje tvrtka razvija i kooperaciju te je jedan od najvećih organizatora proizvodnje koji poljoprivrednicima nudi stručnu pomoć savjetovanja te nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju te od istih vrši otkup poljoprivrednih proizvoda. Društvo također posjeduje postrojenje za doradu sjemenske robe – ječma, pšenice i soje, kako za vlastite potrebe, tako i za prodaju na tržištu.

Tvrta **Fermopromet** svakodnevno se bazira na tehnološkim inovacijama u poljoprivredi kako bi kvalitetu postavili na najveću razinu. Od velikog je značaja za međunarodno poslovanje ulazak Republike Hrvatske u EU, čime se ostvaruje bolja komunikacija sa zemljama članicama EU, te učvršćivanje poslovnih veza i suradnje



SJEMENSKA PROIZVODNJA

Pokrenuli smo još jedan projekt u Hrvatskoj –
SJEMENSKU PROIZVODNJU DEKALB® KUKRUZA

Naš partner u tom projektu tvrtka **PPK Valpovo članica Agroinvest grupe** prepoznaла je benefite ovog projekta te odlučila biti prvi proizvođač Dekalb® sjemena u Hrvatskoj.

Izjava **Ivana Brkića**, voditelja proizvodnje na **PPK Valpovo članica Agroinvest grupe**:



„Sa sigurnošću mogu reći da smo zadovoljni s Dekalb® genetikom koju koristimo na našim površinama jer s njom uvijek ostvarujemo odlične rezultate. Prepoznali smo vrijednost projekta i zato se odlučili za partnerstvo s tvrtkom Bayer, koja je svjetski priznata inovacijska tvrtka s tradicijom starom više od 150 godina te ključnim kompetencijama u području poljoprivrede. Vjerujemo da će naša suradnja otvoriti nove mogućnosti i unaprijediti našu proizvodnju sjemena.“



Mali je to korak za Bayer globalno, ali je jako veliki korak za nas u Bayer Hrvatska, kao i za naše sadašnje i buduće partnerne u tom projektu te vjerujemo da ćete prepoznati ovu priliku i da će proizvodnja DEKALB® sjemena ozbiljno zaživjeti na hrvatskim poljima.

Ukoliko imate polja pod navodnjavanjem i možete osigurati prostornu izolaciju, pozivamo vas da nam se pridružite i iskoristite ovu priliku.



Navodnjavanje - **PPK Valpovo članica Agroinvest grupe**



Cvatnja – ženska linija
PPK Valpovo članica Agroinvest grupe



Cvatnja – muška linija
PPK Valpovo članica Agroinvest grupe



Skidanje metlica - **PPK Valpovo članica Agroinvest grupe**



Sjetva - **PPK Valpovo članica Agroinvest grupe**



Nicanje biljki - **PPK Valpovo članica Agroinvest grupe**

Iznikle biljke - **PPK Valpovo članica Agroinvest grupe**



Žetva - **PPK Valpovo članica Agroinvest grupe**



PPK VALPOVO DZC 4897

PORTFOLIO DEKALB® HIBRIDA

Tip klipa: fix i flex
Potencijal primosa
Otpuštanje vlage
Tolerantnost na sušu
Početni porast
Čvrstoća stablike
Korijenov sistem
Tolerantnost na bolesti
Kvaliteta žma

HIBRID	FIELD SHIELD	ACCELERON	FAO GRUPA											
DKC4391	🛡	🌿	340	Flex	9	9	9	8	10	10	9	9		
DKC4712	🛡	🌿	360	Flex	10	10	10	9	8	8	9	9		
DKC4726	🛡	🌿	380	Flex	10	9	10	9	10	10	9	10		
DKC4897	🛡	🌿	390	Flex	10	10	9	9	9	9	10	9		
DKC4943		🌿	390	Flex	9	9	10	10	9	9	9	9		
EW4843*	🛡	🌿	410	Flex	10	9	10	10	10	10	10	10	9	
DKC5016		🌿	420	Fix	9	9	9	10	9	9	8	9		
DKC5092	🛡	🌿	440	Flex	9	9	10	9	10	10	9	9		
DKC5110 DUAL HIBRID	🛡	🌿	440	Flex	10	9	8	10	10	10	10	10	10	
DKC5182		🌿	450	Flex	10	9	9	8	10	10	8	9		
DKC5206	🛡	🌿	450	Flex	10	9	10	9	10	10	9	10		
DKC5404		🌿	460	Fix	9	9	8	9	10	10	9	9		
DKC5685	🛡	🌿	490	Flex	9	9	9	10	9	9	9	9		
DKC5709		🌿	510	Flex	10	9	9	9	10	10	9	9		
DKC5810	🛡	🌿	520	Flex	10	9	9	10	10	9	9	9		
DKC5911 SILAŽNI	🐄	🌿	550	Flex	10	9	9	10	10	10	10	10	10	



Skeniraj ovdje i pogledaj rezultate pokusa Dekalb® hibrida diljem Hrvatske



u lošijim uvjetima proizvodnje (cm)
u optimalnim uvjetima proizvodnje (cm)
u intenzivnim uvjetima (cm)
u lošijim uvjetima - u zetu
u optimalnim uvjetima - u zetu
u optimalnim uvjetima - u ženi
u intenzivnim

HIBRID	Razmak u redu prilikom sjetve			Očekivani broj biljaka		
DKC4391	21	18.5-18.3	17.4-17.2	68.000	77.000-78.000	82.000-83.000
DKC4712	22-21	21-20.1	20.1-19.6	65.000-68.000	68.000-71.000	71.000-73.000
DKC4726	22-21	21-20.1	20.1-19.6	65.000-68.000	68.000-71.000	72.000-73.000
DKC4897	21.6-20.4	20.4-19	19.3-17.9	66.000-70.000	70.000-75.000	74.000-80.000
DKC4943	22-20.7	20.4-19		65.000-69.000	70.000-75.000	
EW4843*	20.4-19.6	19-17.6	17.4-16.8	70.000 - 73.000	75.000 - 80.000	81.000- 85.000
DKC5016		19.3-18.5	17.6-17.2		74.000-77.000	81.000-83.000
DKC5092	20.4-19.6	19-17.6	17.4-16.8	70.000-73.000	75.000-81.000	82.000-85.000
DKC5110 DUAL HIBRID		19.3-17.9	17.9-16.8		75.000-80.000	80.000-85.000
DKC5182		19.3-18.5	17.6-17.2		74.000-77.000	81.000-83.000
DKC5206	20.1-19	19.8-18.3	18.5-17.4	71.000-75.000	72.000-78.000	77.000-82.000
DKC5404	20.4-19.6	19-17.9	17.9-17.2	70.000-73.000	75.000-80.000	80.000-83.000
DKC5685		19.8-18.3	18.5-17.4		72.000-78.000	77.000-82.000
DKC5709	20.4-19.3	19-17.9	17.9-17.2	70.000-73.000	75.000-80.000	80.000-83.000
DKC5810	20.4-19.8	19.8-17.9	18.3-17.4	70.000-72.000	72.000-80.000	78.000-82.000
DKC5911 SILAŽNI		19-17.9	17.9-16.8		75.000 - 80.000	80.000- 85.000

* hibrid je u procesu registracije, potencijalno komercijalno ime DKC4933



DKC4391

ODLIČAN HIBRID ZA RAZNE
VRSTE TLA

ACCELERON STANDARD
SEED APPLIED SOLUTIONS

ACCELERON ELITE
SEED APPLIED SOLUTIONS



DKC4712

NENADMAŠAN U PRINOSU U
SVOJOJ GRUPI

ACCELERON STANDARD
SEED APPLIED SOLUTIONS

ACCELERON ELITE
SEED APPLIED SOLUTIONS



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	9
OTPUŠTANJE VLAGE	9
TOLERANTNOST NA SUŠU	9
POČETNI PORAST	9
ČVRSTOĆA STABLJIKE	9
KORIJENOV SISTEM	9
TOLERANTNOST NA BOLESTI	9
KVALITETA ZRNA	9



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	9
OTPUŠTANJE VLAGE	9
TOLERANTNOST NA SUŠU	9
POČETNI PORAST	9
ČVRSTOĆA STABLJIKE	9
KORIJENOV SISTEM	9
TOLERANTNOST NA BOLESTI	9
KVALITETA ZRNA	9



FAO
340

ZNAČAJKE

- // preporučeno vrijeme sjetve: temperatura tla treba biti iznad 10°C
- // zahvaljujući izvrsnoj otpornosti na stres, stabilnosti u žetvi, može se uspješno uzgajati na svim vrstama tla
- // zahvaljujući snažnom korijenovom sustavu i čvrstoći stabljičke, odolijeva većini negativnih utjecaja na okoliš
- // brzo otpuštanje vlage



FAO
360

ZNAČAJKE

- // jedan od nasljednika hibrida DKC4943
- // hibrid sa sve uvjete proizvodnje
- // izuzetno adaptibilan
- // fleksibilan hibrid, može nadoknaditi gubitak sklopa sa povećanjem klipa

PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

68

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

77-78

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

82-83

x1.000 biljaka/ha

PREDNOSTI



STABILNOST U SVIM UVJETIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim proizvodnim godinama. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uvjetima proizvodnje.



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

65-68

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

68-71

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

71-73

x1.000 biljaka/ha

PREDNOSTI



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



STABILNOST U SVIM UVJETIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim proizvodnim godinama. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uvjetima proizvodnje.

NOVO

DKC4726

HIBRID ZA SVE UVJETE
PROIZVODNJEACCELERON
SEED APPLIED SOLUTIONS

ELITE



DKC4897

IZUZETNO FLEKSIBILAN

ACCELERON STANDARD

ACCELERON ELITE



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10

FAO
380

ZNAČAJKE

- // nasljednik DKC4717
- // izrazito adaptibilan hibrid, za sve uvjete proizvodnje
- // fleksibilan hibrid koji dobro podnosi stresne uvjete
- // ima visok potencijal prinosa
- // bolje reagira na povećanje sklopa u sjetvi od DKC4712
- // dobra agronomска svojstva
- // dobra tolerantnost na bolesti

PREPORUČENA
GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

65-68

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

68-71

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

72-73

x1.000 biljaka/ha

PREDNOSTI



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

STABILNOST U SVIM
UVJETIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim proizvodnim godinama. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uvjetima proizvodnje.



DOBRA AGRONOMSKA SVOJSTVA

Snažan korijen i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tijekom vegetacije, tako i prije žetve. Sjetvom hibrida sa snažnim korijenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja usjeva zbog jakih vjetrova.



Također, kod ovog hibrida je moguća kasnija žetva sa malim rizikom od polijeganja i pucanja stabljike.

FAO
390PREPORUČENA
GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

66-70

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

70-75

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

74-80

x1.000 biljaka/ha

PREDNOSTI

STABILNOST U SVIM
UVJETIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim proizvodnim godinama. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uvjetima proizvodnje.



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



BOLJA TOLERANTNOST NA BOLESTI

Povećajte prinos i kvalitetu kukuruza sa hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na glivična oboljenja kao što je Fusarium sp.



DKC4943

PROVJERENA DEKALB®
KVALITETA



EW4843*

EW4843*

KORAK NAPRIJED U
PROIZVODNJI KUKURUZA

ACCELERON STANDARD

ACCELERON ELITE

NOVO



FIELD
SHIELD

KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10

* hibrid je u procesu registracije, potencijalno komercijalno ime DKC4933

FAO
390

ZNAČAJKE

- // hibrid koji će i s manjim ulaganjima u proizvodnji dati iznadprosječne rezultate
- // fleksibilan hibrid, može nadoknaditi gubitak sklopa s povećanjem klipa
- // dobar početni porast s velikom lisnom masom



PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

65-69

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

70-75

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

-

x1.000 biljaka/ha

PREDNOSTI



DOBRA AGRONOMSKA SVOJSTVA

Snažan korjen i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tijekom vegetacije, tako i prije žetve. Sjetvom hibrida sa snažnim korijenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja usjeva zbog jakih vjetra.



Također, kod ovog hibrida je moguća kasnija žetva sa malim rizikom od polijeganja i pucanja stabljike.



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



STABILNOST U SVIM UVJETIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosova je moguće i u teškim proizvodnim godinama. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uvjetima proizvodnje.



FAO
410

PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

70-73

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

75-80

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

81-85

x1.000 biljaka/ha

PREDNOSTI



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



STABILNOST U SVIM UVJETIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosova je moguće i u teškim proizvodnim godinama. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uvjetima proizvodnje.



TOLERANTAN NA SUŠU



DKC5016

RANI FAVORIT U GRUPI 400

ACCELERON
SEED APPLIED SOLUTIONS
ELITE



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10

FAO
420

ZNAČAJKE

- // preporučuje se za intenzivnije uvjete proizvodnje
- // preporučuje se sjetva u gustom sklopu
- // visok potencijal prinosa
- // brzo otpuštanje vlage
- // dobrih agronomskih svojstava

PREDNOSTI



DOBRA AGRONOMSKA SVOJSTVA

Snažan korijen i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tijekom vegetacije, tako i prije žetve. Sjetvom hibrida sa snažnim korijenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja usjeva zbog jakih vjetrova.



Također, kod ovog hibrida je moguća kasnija žetva sa malim rizikom od polijeganja i pucanja stabljike.



OTPUŠTANJE VLAGE

Niska vlaga u žetvi smanjuje troškove proizvodnje eliminirajući potrebu za sušenjem i nema gubitaka prinosa kasnijom žetvom.



STABILNOST U SVIM UVJETIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim proizvodnim godinama. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uvjetima proizvodnje.

PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

74-77

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

81-83

x1.000 biljaka/ha



DKC5092

SIGURAN I STABILAN U SVIM UVJETIMA

ACCELERON STANDARD

ACCELERON ELITE

FIELD SHIELD



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10

FAO
440

ZNAČAJKE

- // preporučuje se za sve uvjete proizvodnje
- // stabilnost u svim uvjetima proizvodnje
- // izvrsna otpornost na sušu
- // dobro reagira na gušće sklopove



PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

70-73

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

75-81

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

82-85

x1.000 biljaka/ha

PREDNOSTI



DOBRA AGRONOMSKA SVOJSTVA

Snažan korijen i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tijekom vegetacije, tako i prije žetve. Sjetvom hibrida sa snažnim korijenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja usjeva zbog jakih vjetrova.



Također, kod ovog hibrida je moguća kasnija žetva sa malim rizikom od polijeganja i pucanja stabljike.



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerancnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



STABILNOST U SVIM UVJETIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim proizvodnim godinama. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uvjetima proizvodnje.

NOVO

DKC5110

NOVI HIBRID ZA NOVI
SEGMENTACCELERON[®] SEED APPLIED SOLUTIONS ELITEFIELD
SHIELD

KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10

FAO
440

ZNAČAJKE

- // dual hibrid
- // visoka stabljika
- // visok potencijal prinosa
- // izvrstan omjer stabiljke i klipa zbog čega je izvrstan i za slažu
- // izrazito kvalitetna silaža
- // odlična tolerantnost na bolesti

PREDNOSTI



DOBRA AGRONOMSKA SVOJSTVA

Snažan korijen i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tijekom vegetacije, tako i prije žetve. Sjetvom hibrida sa snažnim korijenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja usjeva zbog jakih vjetrova.



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



ODLIČNA KVALITETA SILAŽE

Ostavlja prostor farmeru da se u tijeku sezone odluci o namjeni samog usjeva (zrno ili silaža).



BOLJA TOLERANTNOST NA BOLESTI

Povećajte prinos i kvalitetu kukuruza sa hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na glijivična oboljenja kao što je Fusarium sp.

PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

75-80

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

80-85

x1.000 biljaka/ha

DKC5182

ZAGARANTIRANO DOBAR
PRINOSACCELERON[®] STANDARDACCELERON[®] ELITE

KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10

FAO
450

ZNAČAJKE

- // izuzetna kvaliteta zrna
- // hibrid koji je namjenjen za vrhunske prinose i intenzivne uvjete proizvodnje
- // u povoljnim proizvodnim godinama i uz dobru agrotehniku donosi rekordne prinose



PREDNOSTI



DOBRA AGRONOMSKA SVOJSTVA

Snažan korijen i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tijekom vegetacije, tako i prije žetve. Sjetvom hibrida sa snažnim korijenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja usjeva zbog jakih vjetrova.



Također, kod ovog hibrida je moguća kasnija žetva sa malim rizikom od polijeganja i pucanja stabljike.



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



PRILAGODLJIVOST NA VISOKE SKLOPOVE

Preporučuje se pridržavanje preporuka za gustoću jer hibrid pokazuje pozitivnu korelaciju između gustoće i prinosa.



DKC5206

GENETIKA ZA
PROFESSIONALCE

ACCELERON STANDARD
SEED APPLIED SOLUTIONS

ACCELERON ELITE
SEED APPLIED SOLUTIONS

FIELD
SHIELD



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10

FAO
450

ZNAČAJKE

- // nasljednik hibrida DKC5182
- // hibrid koji je namjenjen za vrhunske prinose i intenzivne uvjete proizvodnje
- // u povoljnim proizvodnim godinama i uz dobru agrotehniku donosi rekordne prinose
- // namijenjen profesionalcima

PREDNOSTI



DOBRA AGRONOMSKA SVOJSTVA

Snažan korijen i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tijekom vegetacije, tako i prije žetve. Sjetom hibrida sa snažnim korijenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja usjeva zbog jakih vjetrova.



Također, kod ovog hibrida je moguća kasnija žetva sa malim rizikom od polijeganja i pucanja stabljike.



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



BOLJA TOLERANTNOST NA BOLESTI

Povećajte prinos i kvalitetu kukuruza sa hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na gljivična oboljenja kao što je *Fusarium sp.*

PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

71-75

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

72-78

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

77-82

x1.000 biljaka/ha



FAO
460

ZNAČAJKE

- // stabilnost u svim uvjetima proizvodnje
- // brzo otpuštanje vlage
- // snažan korijen i čvrsta stabljika
- // visok potencijal prinosa
- // odlično podnosi teška tla

PREDNOSTI



DOBRA AGRONOMSKA SVOJSTVA

Snažan korijen i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tijekom vegetacije, tako i prije žetve. Sjetom hibrida sa snažnim korijenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja usjeva zbog jakih vjetrova.



Također, kod ovog hibrida je moguća kasnija žetva sa malim rizikom od polijeganja i pucanja stabljike.



OTPUŠTANJE VLAGE

Niska vlaga u žetvi smanjuje troškove proizvodnje eliminirajući potrebu za sušenjem i nema gubitaka prinosa kasnijom žetvom.



STABILNOST U SVIM UVJETIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim proizvodnim godinama. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uvjetima proizvodnje.

DKC5404

PRILAGODLJIV SVIM UVJETIMA



ACCELERON STANDARD
SEED APPLIED SOLUTIONS

ACCELERON ELITE
SEED APPLIED SOLUTIONS



DKC5685

DOKAZAN U PRINOSU I
KVALITETI

ACCELERON
SEED APPLIED SOLUTIONS

ELITE



DKC5709

REKORDER VISOKIH FAO
GRUPA

ACCELERON
SEED APPLIED SOLUTIONS

ELITE



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10

FAO
490

ZNAČAJKE

- // izuzetna kvaliteta zrna
- // pogodan za ranu sjetvu zbog tolerantnosti na niske temperature
- // prilikom sjetve u ranim rokovima, kukuruz ranije završava oplodnju i time izbjegava stres u periodu cvatnje



PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

72-78

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

77-82

x1.000 biljaka/ha

PREDNOSTI



OTPUŠTANJE VLAGE

Niska vlaga u žetvi smanjuje troškove proizvodnje eliminirajući potrebu za sušenjem i nema gubitaka prinosa kasnijom žetvom.



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



PRILAGODLJIVOST NA VISOKE SKLOPOVE

Preporučuje se pridržavanje preporuka za gustoću jer hibrid pokazuje pozitivnu korelaciju između gustoće i prinosa.



PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

70-73

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

75-80

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

80-83

x1.000 biljaka/ha

FAO
510

ZNAČAJKE

- // stabilnost u svim uvjetima proizvodnje
- // snažan korijen i čvrsta stabljika
- // visok potencijal prinosa

PREDNOSTI



DOBRA AGRONOMSKA SVOJSTVA

Snažan korijen i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tijekom vegetacije, tako i prije žetve. Sjetvom hibrida sa snažnim korijenom i jakom stabljkicom smanjuje se rizik od propadanja usjeva zbog jakih vjetrova.



Također, kod ovog hibrida je moguća kasnija žetva sa malim rizikom od polijeganja i pucanja stabljike.



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



STABILNOST U SVIM UVJETIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim proizvodnim godinama. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uvjetima proizvodnje.



DKC5810

NAJNOVIJA GENETIKA ZA
VISOKE PRINOSE

ACCELERON STANDARD
ACCELERON ELITE



DKC5911

SILAŽNI HIBRID

ACCELERON STANDARD



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10



KARAKTERISTIKE

POTENCIJAL PRINOSA	10
OTPUŠTANJE VLAGE	10
TOLERANTNOST NA SUŠU	10
POČETNI PORAST	10
ČVRSTOĆA STABLJIKE	10
KORIJENOV SISTEM	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	10
KVALITETA ZRNA	10

FAO
520

ZNAČAJKE

- // DEKALB® hibrid izuzetno visokog genetskog potencijala za prinosa suhog zrna i vlažnog zrna za siliranje (VVK)
- // nasljednik hibrida DKC5830 sa većim potencijalom prinosa i boljom tolerantnošću na bolesti
- // tolerantan na stresne uvjete proizvodnje
- // u 2023. pobjednik u prinosu na većini polja u Hrvatskoj



PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

70-72

x1.000 biljaka/ha

OPTIMALNI UVJETI

72-80

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

78-82

x1.000 biljaka/ha

PREDNOSTI



DOBRA AGRONOMSKA SVOJSTVA

Snažan korijen i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tijekom vegetacije, tako i prije žetve. Sjetvom hibrida sa snažnim korijenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja usjeva zbog jakih vjetrova.



Također, kod ovog hibrida je moguća kasnija žetva sa malim rizikom od polijeganja i pucanja stabljike.



VISOK POTENCIJAL PRINOSA

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.



BOLJA TOLERANTNOST NA BOLESTI

Povećajte prinos i kvalitetu kukuruza sa hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na gljivična oboljenja kao što je *Fusarium sp.*

PREPORUČENA GUSTOĆA

LOŠIJI UVJETI

75

x1.000 biljaka/ha

INTENZIVNI UVJETI

85

x1.000 biljaka/ha

FAO
550




Zaštita bilja



Katalog je informativnog karaktera. Prije primjene sredstva za zaštitu bilja obavezno pažljivo pročitati etiketu, odnosno uputu za primjenu, koja se nalazi na svakom proizvoda.

Zaštita

kukuruza



	ADENGO®	Equip®	LAUDIS	MONSOON® active	Oizysa® 480 SL
jednogodišnji širokolisni korovi	✓	neki	✓	✓	✓
jednogodišnji uskolisti korovi	✓	✓	✓	✓	
višegodišnji uskolisti korovi	neki	✓	neki	✓	
višegodišnji širokolisni korovi					✓
folijarno djelovanje	✓	✓	✓	✓	✓
zemljano djelovanje	✓	-	-	✓	
preporučena doza/ha	0,44 l/ha	2 - 2,5 l/ha	2 - 2,25 l/ha	1,8 l/ha	0,3 - 0,5 l/ha



Ambrozija, partizanka
(*Ambrosia spp.*)

Evropski mračnjak
(*Abutilon theophrasti*)

Bijela loboda
(*Chenopodium album*)

Štir
(*Amaranthus retroflexus*)



Koštan
(*Echinochloa crus-galli*)

Muhari
(*Setaria spp.*)

Divlji sirak
(*Sorghum halepense*)



Baš kako treba.

Herbicid br. 1 na hrvatskom tržištu, svaka druga njiva u Hrvatskoj je tretirana s ovim herbicidom.

Nezamjenjiv alat u suzbijanju rezistentnog divljeg sirka na ALS herbicide.



Bez ograničenja.

Borba protiv rezistentnih korova

IWM platform 2018-2023
Novaki Oborovski

Borba protiv divljeg sirka rezistentnog na ALS herbicide!

Jeste li znali da je rezistentnost korova izazov broj 1. u poljoprivrednoj proizvodnji i da svake godine raste broj korovskih vrsta rezistentnih na pojedine herbicide različitog mehanizma djelovanja?

Znate li da je učestala uporaba herbicida istog mehanizma djelovanja (MoA) uz uski plodored i monokulturu jedan od najčešćih razloga za pojavu rezistentnosti korova?

Zadnjih godina često nas zovete i želite se na lošu učinkovitost sulfonilurea herbicida (pripadaju skupini ALS inhibitora, HRAC MoA Grupa 2) na divlji sirak i ambroziju u kukuruzu i soji. Jeste li znali da je to prvi znak, koji bi mogao ukazivati na problem, te signal da nas kontaktirate kako bismo vam pomogli utvrditi stanje?

2017. godine u Hrvatskoj je prvi put potvrđena rezistentnost divljeg sirka na ALS herbicide u kukuruzu i do danas je potvrđena na dosta lokacija u Hrvatskoj.


Kukuruz je vodeća kultura u našoj zemlji, a divlji sirak jedan od glavnih korova u ovoj kulturi, posebno u nekim važnim proizvodnim područjima za ovu kulturu. Jeste li svjesni da je suzbijanje rizomskog divljeg sirka moguće samo s herbicidima iz ALS skupine?

2018. godine u Novakima Oborovskim na parceli OPG-a Tihomir Piska na kojoj smo prethodno potvrdili rezistentnost divljeg sirka na ALS herbicide postavili smo **Platformu za integrirano suzbijanje korova (IWM)**. Kroz višegodišnje pokuse cilj nam je bio pronalazak održivog rješenja za kontrolu divljeg sirka rezistentnog na ALS herbicide u kukuruzu i edukacija poljoprivrednika i svih zainteresiranih strana o ovoj problematici.

Ovaj projekt polučio je velik uspjeh, prepoznat je kako na domaćem tako i na međunarodnom planu. Našu platformu posjetili su mnogi proizvođači, studenti, ali i kolege iz drugih zemalja gdje su imali prilike vidjeti i učiti na licu mesta kako pristupiti rješavanju ovog sve više gorućeg problema.


Pokusi su uključivali integraciju različitih strategija i mera kontrole korova kako bi se smanjila populacija divljeg sirka u polju i dugoročno banka sjemena i rizoma u tlu i to:

1. Oranje
2. Plodored
3. Čišćenje strništa - Glifosat
4. Mehanička kontrola korova (kultivacija između redovima) i
5. Kemiska kontrola korova korištenjem herbicida različitih mehanizama djelovanja (MoA)



Rješenje za suzbijanje divljeg sirka iz sjemena i rizoma rezistentnog na ALS herbicide

Integrirane mjere suzbijanja korova i upotreba herbicida drugačijih mehanizama djelovanja




Adengo® 0,44 l/ha (kada rizomski sirak izade van)

Laudis® 2,25 l/ha (10-14 dana poslije, neposredno prije nego divlji sirak počne mijenjati boju)

Ova kombinacija uspješno suzbija rezistentni divlji sirak na ALS herbicide i u slučaju monokulture kukuruza


Učinkovitost integriranih mjer suzbijanja 2018-2022
Konačni rezultati 2022 u usporedbi s početnim stanjem 2018



Nakon 5 godina provođenja integriranih mjer suzbijanja korova (plodored, glifosat na strništu, upotreba herbicida drugačijih mehanizama djelovanja, kultivacija) uspjeli smo riješiti populaciju rezistentnog divljeg sirka na ALS herbicide i omogućiti daljnju proizvodnju kukuruza na ovoj parceli.

Zaštita

žitarica od korova



*Sredstvo odobreno za primjenu u malim namjenama/kulturama. Odgovornost za primjenu sredstva sukladno odobrenju na malim kulturama/namjenama u smislu učinkovitosti i/ili fitotoksičnosti preuzima korisnik sredstva.

	alister ^{NEW}	hussar [®] Star	hussar [®] OD	Sekator [®] OD
Širokolisni korovi	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Travni korovi	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓
Vrijeme primjene	od jeseni do ranog proljeća	proljeće	proljeće	proljeće
Doza/ha	1 l	0,3 kg	0,1 l	0,15 l
Potreban okvašivač	ne	Mero 1l/ha	Mero 1l/ha	ne

✓ djelovanje na neke korove


✓ izvrsno djelovanje na najznačajnije korovske vrste

✓ izvanredno djelovanje na sve korove uključujući i one tvrdokorne



Strategija

zaštite pšenice od bolesti



**Ascra®
Xpro**

**X PRO | Siguran partner
za savršen prinos**

- // izvrsna kontrola bolesti
- // dugotrajno djelovanje
- // green i antistres učinak

- // širok spektar bolesti
- // preventivno i kurativno djelovanje
- // teško se ispire kišom
- // provjereno najbolji fungicid u 2023. u teškim uvjetima zaraze




**Delaro®
FORTE**

**Kompletno
rješenje.**

Strategija

zaštite ječma od
bolesti



Sve što trebate znati o zaštiti žitarica od bolesti

Kada je pravo vrijeme za zaštitu pšenice i ječma?

Odrediti pravi trenutak kada započeti s tretiranjem protiv bolesti nije jednostavno i ovisi o mnogo faktora, ali najvažnija su ova četiri:

1. Fenofaza usjeva (ona je ključna kod razmatranja kad treba krenuti u zaštitu, kod pšenice je to pojava 3. lista (najčešće se 3.list pojavljuje ovisno o vremenskim prilikama između stadija prvog - drugog koljenca ili stadija 2. koljenca), a kod ječma stadij busanja do stadija početka vlatanja

2. Oborine i temperature

3. Vrsta bolesti (o vrsti bolesti i njenom periodu inkubacije ovisi vrijeme u kojem stignemo reagirati fungicidom i sprječiti njeno daljnje širenje)

4. Sortiment (neke sorte su više osjetljive na napad pojedinih bolesti)


Kad usjev uđe u odgovarajuću fenofazu, a imamo vremenske prilike povoljne za razvoj bolesti obvezno treba ići u tretiranje.

Temperature su te koje utječu na rast i razvoj usjeva, a u kombinaciji s količinama oborina utječu na pojavu i širenje bolesti. Najčešća pogreška koja se događa u praksi je ta da se ide prerano u prvo tretiranje dok usjev još uvijek nije u prvoj fenofazi i onda ostavimo najvažnije prinosne organe nezaštićene duži period ili se zakasni s tretiranjem pa koristite neodgovarajući fungicid, koji nema kurativno djelovanje.


Ove godine imali smo hladnije proljeće pa su usjevi bili duži period, skoro mjesec dana, u fenofazi početka vlatanja, a mnogi proizvođači su upravo tada odradili tretiranja. Kad je konačno izšao novi organ, 3. list, bio je nezaštićen, a infekcije žutom hrđom su upravo tada započele.

Kako ova bolest ima kratak inkubacijski period trebalo je reagirati odmah s odgovarajućim fungicidom, ali to nije bilo uvijek moguće.

Prinosni organi pšenica



Prinosni organi ječam



Koji organi su zaštićeni nakon aplikacije fungicida?

Vrlo je važno znati da u pšenici ne postoje sistemični fungicidi koji se premeštaju u novoizrasle organe. Svaki novoizrasli organ nakon primjene fungicida je nezaštićen, a o dugotrajnosti djelovanja možemo govoriti samo gledajući organe koji su bili vani u vrijeme tretmana.

■ Neprskano tkivo
■ Prskano tkivo

Koji listovi su zaštićeni kada prskamo u BBCH 32?



T1 - ŠITI 3. LIST BBCH 32

T2 - ŠITI ZASTAVICU BBCH 39 i dodatno drugi list

T3 - ŠITI KLAS BBCH 59 i dodatno zastavicu


Izbor fungicida je jedan od ključnih faktora u zaštiti bolesti

Odabir odgovarajućeg fungicida je itekako važan kod zaštite usjeva od bolesti. Fungicidi se razlikuju po načinu i spektru djelovanja, po dužini djelovanja (koliko dugo drži organ zaštićen – preventivno djelovanje), imaju li kurativno djelovanje (mogu li zaustaviti širenje bolesti ukoliko je već došlo do infekcije) ili ne.

Treba znati da zaštita fungicidima nije ista kao i prije 20 - 30 godina. Mijenja se klima, mijenja se sortiment, vrste bolesti, a s tim promjenama dolaze novije generacije fungicida koje mogu odgovoriti na nove izazove u proizvodnji. Fungicidi koji su se koristili prije 30 god, a i danas ih dosta proizvođača koristi jer su im povoljni po cijeni, dobri su u rješavanju pepelnice koja je nekad u prošlosti bila glavna bolest, a danas je skoro nema, ali nisu baš dobra rješenja protiv septorije ili žute hrđe, odnosno nisu toliko učinkoviti na te bolesti. Današnji moderni fungicidi pripadaju skupinama fungicida SDHI, tu su još i strobilurini te novija generacija triazola. Važno je znati da su SDHI fungicidi i strobilurini čisti preventivci, nemaju kurativno djelovanje, a da od tih dviju skupina SDHI fungicidi imaju najduže djelovanje odnosno dugo preventivno štite biljku. Rijetki su fungicidi koji mogu pružiti kurativno djelovanje, ali svi naši fungicidi zahvaljujući a.t. protiokonazol imaju i kurativno djelovanje.

ASCRA XPRO


Učinkovitost% u odnosu na konkurentni SDHI fungicid
Samo jedna primjena u stadiju zastavice (BBCH 39)
(prosjek 4 pokusa)



Odlika svih Bayerovih fungicida nove generacije Delaro forte i Ascra Xpro je da su oni kombinirani fungicidi (kombinacija SDHI a.t. i protiokonazola) koji imaju dugo preventivno djelovanje, ali i kurativno djelovanje što znači da su u stanju zaustaviti širenje bolesti na pola inkubacijskog perioda, ali i da pružaju dugotrajanu zaštitu usjeva što je definitivno potvrđeno ove godine u praksi.

Proizvođači koji su koristili Delaro forte i Ascra Xpro u svojoj proizvodnji imali su zdrav usjev i postigli su i ove godine visoke prinose.

uljane repice



bolesti



štetnici




Zlata vrijedan.



- // izvrsna kontrola bolesti
- // dugotrajno djelovanje
- // antistres učinak
- // primjeniti početkom cvatnje

Zaštita krumpira

od korova i bolesti



herbicide fungicide

Herbicide	Plateen®	Sencor®	Challenge®
Prije nicanja krumpira	✓	✓	✓
Nakon nicanja krumpira do 10 cm	X	✓	X
Jednogodišnji uskolisni korovi	+++	+	+++
Jednogodišnji širokolisni korovi	+++	+++	++
Doza u solo primjeni	2-2,5 kg/ha	0,9 l/ha nakon sadnje, prije nicanja krumpira 0,55 l/ha nakon nicanja krumpira	4 l/ha, primjena nakon sjetve prije nicanja (pre-em)
Potreban partner i doza		Sencor 0,3 - 0,5 l/ha + Challenge 2 l/ha	Challenge 2 l/ha + Sencor 0,3 - 0,5 l/ha

⊕ djeluje na neke korove

⊕⊕ odlično suzbija većinu korova

⊕⊕⊕ odlično suzbija sve korove

bolesti



"Bijela nogu"
(*Rhizoctonia solani*)



Plamenjača krumpira
(*Phytophthora infestans*)



Koncentrična pjegavost
krumpira
(*Alternaria solani*)



INFINITO®



Proizvodi

pregled proizvoda prema
namjeni

FUNGICIDI

Ascra Xpro
Delaro Forte
Falcon Forte
Folicur EW 250
Infinito
Propulse
Prosaro 250 EC

INSEKTICIDI

Decis 100 EC

BIOLOŠKI PROIZVODI

Serenade Aso
Flipper

HERBICIDI

Adengo
Alister New
Betanal Tandem
Challenge 600
Equip
Hussar OD
Hussar Star
Laudis
Monsoon Active
Oizysa 480 SL
Sekator OD
Sencor SC 600



Proizvodi

pregled proizvoda prema
usjevima

ŽITARICE

FUNGICIDI
Ascra Xpro
Delaro Forte
Falcon Forte
Prosaro 250 EC

HERBICIDI

Alister New
Hussar Star
Sekator OD
Hussar OD

INSEKTICIDI
Decis 100 EC
Flipper

KUKURUZ

FUNGICIDI
Propulse

HERBICIDI
Adengo
Equip
Laudis
Monsoon Active
Oizysa 480 SL

INSEKTICIDI
Decis 100 EC
Flipper

ULJANA REPICA

FUNGICIDI
Folicur EW 250
Propulse
HERBICIDI
Prosaro 250 EC
Serenade Aso

INSEKTICIDI
Decis 100 EC
Flipper

SUNCOKRET

FUNGICIDI
Propulse
HERBICIDI
Challenge 600

INSEKTICIDI
Decis 100 EC
Flipper

ŠEĆERNA REPA

HERBICIDI
Betanal Tandem SC

FUNGICIDI
Propulse
INSEKTICIDI
Challenge 600
Sencor SC 600

SOJA

INSEKTICID I AKARICID
Flipper



HERBICIDI





ADENGO®

HRAC MoA grupa = "27"+"2"

Adengo® je novi zemljinski herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu, nakon sjetve do 3 lista kukuruza.

Kultura:

kukuruz

Aktivna tvar:

// izoksaflutol 225 g/l
// tienkarbazon – metil 90 g/l
// zaštitna tvar – Ciprosulfamid 157,1 g/l

Formulacija:

SC – koncentrat za suspenziju

Doza primjene:

0,44 l/ha

Karenca:

osigurana vremenom primjene

BAŠ KAKO TREBA. JEDNOSTAVNO ČISTO

// Ima bolju djelotvornost na travne korove u većem razvojnom stadiju (npr. koštan do početka busanja).

// Jedini zemljinski herbicid koji ima djelotvornost na višegodišnje korove (sirak, ljlaj, pirika, štavelj).

// Svojstvo reaktivacije vrlo je važno kada su u pitanju korovi koji imaju produženo i neujednačeno nicanje (npr. europski mračnjak – *Abutilon theophrasti*).

// Za aktivaciju treba manje kiše od standardnih zemljinskih herbicida (10 mm).

// Može duže čekati kišu.

// Sadrži zaštitnu tvar – ne stopira kukuruz u rastu i razvoju čak ni u slučaju velikih oborina.

PRIMJENA:

Adengo® je kombinirani herbicid novije generacije koji je namijenjen suzbijanju najšireg spektra jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu. Pokazuje i dobru učinkovitost (stopirajuće djelovanje) na višegodišnje korove (sirak, ljlaj, slak, štavelj, osjak). Primjenjuje se u dozi 0,44 l/ha nakon sjetve kukuruza do stadija 3 lista kukuruza.

Adengo djeluje na korove preko lista (kontaktno djelovanje) i preko korijena (zemljisko djelovanje) te ima sposobnost reaktivacije nakon svake kiše i na taj način sprječava novo nicanje korova.

// u slučaju višegodišnjih širokolisnih korova, slak, osjak, preporučuje mu se dodati herbicid Oizysa® (Adengo® 0,44 L/ha + 0,3 L/ha Oizysa®)

ALAT U BORBI PROTIV REZISTENTNOG SIRKA

Praksa je pokazala da je Adengo® nezamjenjiv u strategiji suzbijanja sirka koji je rezistentan na sulfonilurea herbicide. U slučaju rezistentnog sirka sljedeća je preporuka za primjenu herbicida:

1. Rani post-em: Adengo 0,44 l/ha BBCH 12-13 (najbolji rezultat postiže se ukoliko rizomski sirak već izade van)
2. Post em: Laudis 2,25 l/ha BBCH 14-16 (10-14 dana nakon Adengo prije nego rizomski sirak počne pokazivati znakove oporavka)

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

- // Bolja učinkovitost na korove i najširi spektar.
- // Jedini herbicid koji ima kontaktno i dugotrajno zemljisko djelovanje s mogućnošću reaktivacije.
- // Bolje podnosi sušu (manje ovisan o količini i rasporedu oborina).
- // Siguran za kukuruz i čuva prinos.
- // Jednostavan i siguran za rukovanje, pripremu škropiva i primjenu.



PRIMJENA:

Alister® NEW namijenjen je suzbijanju sljedećih korova: vlasnjače (*Poa spp.*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), ljepljiva broćika (*Galium aparine*), poljski mak (*Papaver rhoeas*), perzijska čestoslavica (*Veronica persica*), bršljenasta čestoslavica (*Veronica hederifolia*), obična slakoperka (*Apera spica-venti*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*), poljska vrukutka (*Aphanes arvensis*), ljljevi (*Lolium spp.*), mišji repak (*Alopecurus myosuroides*), obična mišjakinja (*Stellaria media*), pačja trava (*Juncus bufonius*). Sredstvo se primjenjuje u količini 1 l/ha kada je pšenica u stadiju 3 lista pa sve do završetka busanja.

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

- // Gotova kombinacija koja u jednom prohodu suzbija najznačajnije uskolisne i širokolisne korove.
- // Vrijeme primjene se prilagođava vremenskim uvjetima, mogućnostima i potrebama ratara.
- // Trenutno i dugotrajno djelovanje.
- // Jednostavan za rukovanje i korištenje.

HRAC MoA grupa "12" +"2"

Alister® New je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici.

Kultura:

ozima pšenica, pšenoraž* i pir*

Aktivna tvar:

// diflufenikan 120 g/l
// jodosulfuron 7,5 g/l
// mezosulfuron 9 g/l

Formulacija:

uljni koncentrat za suspenziju (OD)

Doza primjene:

1,0 l/ha

Karenca:

osigurana vremenom primjene

SADA JOŠ BOLJI

// Kompletno rješenje.

// Poboljšan omjer aktivnih tvari, bolja djelotvornost na travne korove i širi spektar djelovanja.

// Jednostavan i fleksibilan.



*Sredstvo odobreno za primjenu u malim namjenama/kulturama. Odgovornost za primjenu sredstva sukladno odobrenju na malim kulturama/namjenama u smislu učinkovitosti i/ili fitotoksičnosti preuzima korisnik sredstva.



Betanal® Tandem®

HRAC MoA grupa "5"+"15"

Betanal® Tandem je kombinirani kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i za smanjenje zakoravljenosti jednogodišnjim uskolistnim korovima u šećernoj repi.

Kultura:

šećerna repa

Aktivna tvar:

// fenmedifam 200 g/l
// etofumesat 190 g/l

Formulacija:

koncentrat za suspenziju (SC)

Doza primjene:

šećerna repa 4,2 l/ha

Karenca:

91 dan za šećernu repu

PRIMJENA:

Selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi.

Primjenjuje se tri puta u razdvojenoj primjeni:

1. 1 l/ha uz dodatak okvašivača Mero 1 l/ha, kada su korovi u stadiju kotiledona
2. 1,5 l/ha uz dodatak okvašivača Mero 1 l/ha, nakon novog ponika korova
3. 1,5 l/ha uz dodatak okvašivača Mero 1 l/ha, nakon novog ponika korova

Radi proširenja spektra djelovanja obavezno svaki put dodati herbicid na bazi Metamitrona 700 SC u dozi 1-1,25 l/ha.

PREPORUKE:

Šećerna repa, zbog svojih osobina i načina uzgoja, pripada među okopavinske kulture sa slabijom natjecateljskom sposobnosti u odnosu na korove. Kako bi očuvali prinos i kvalitetu važno je korove suzbiti u kritičnom periodu zakoravljenosti, a to je za šećernu repu period od stadija razvoja kotiledona do zatvaranja redova šećerne repe. Kako se radi o vremenski jako dugačkom periodu preporučujemo višekratnu primjenu herbicida u manjim dozama i to kako slijedi:

// 1. APLIKACIJA (korovi u fazi kotiledona)

Betanal Tandem 1 L/ha

Mero 1 L/ha

Metamitron 700 SC 1-1,25 L/ha

// 2. APLIKACIJA (nakon novog ponika korova, korovi ponovno u fazi kotiledona)

Betanal Tandem 1,5 L/ha

Mero 1 L/ha

Metamitron 700 SC 1-1,25 L/ha

// 3. APLIKACIJA (nakon novog ponika korova, korovi ponovno u fazi kotiledona)

Betanal Tandem 1,5 L/ha

Mero 1 L/ha

Metamitron 700 SC 1-1,25 L/ha

* za poboljšanje djelovanja na ambrožiju, abutilon, osjak, povijajući heljdu i na travne korove potrebno je dodati partnera (kloprialid, triflusulfuron, fluzifop-p-b, etofumesat).

PRIMJENA:

kultura	reg. doza l/ha	vrijeme primjene	karenca
krumpir	4	pre-em	OVP
luk*	2,5	split primjena, 2x do stadija 5. lista	90 dana
češnjak	4	pre-em	OVP
mrkva*	2,5 ili 1,5+1	pre-em ili split primjena 1,5 l/ha + 1 l/ha do stadija 3. lista	70 dana
celer*	2,5	nakon presadivanja u stadiju 4-8 listova	90 dana
duhan	2,5	pre-em	-

* u ovim kulturama u tablici su prikazane ukupno dozvoljene količine proizvoda. U praksi proizvod koristiti višekratno u smanjenim dozama. Prije primjene posavjetujte se s prodajnim predstavnikom tvrtke Bayer na terenu.

Za pouzdanu učinkovitost i selektivnost za usjev savjetujemo primjenu provjerjenih kombinacija s partnerima:

krumpir	*luk		*mrkva	
	pre-em	pre-em	post-em	pre-em
Challenge® 2 l/ha + Sencor SC 0,3-0,5 l/ha	Challenge® 0,5-0,75 l/ha	1-4 razvijena lista Challenge® 0,3-0,5 l/ha + partneri na bazi a.t. piридата, флуоксипира или клоциралада	Challenge® 1-1,5 l/ha + pendimetalin 2 l/ha + klonazon 0,2 l/ha	2-3 razvijena lista Challenge® 0,5 l/ha ili 4-5 razvijena lista Challenge® 0,5 l/ha + Sencor® SC 0,12 l/ha

* Ukupna doza primjene u **mrkvi i luku** ne smije prelaziti 2,5 l/ha.

Zašto je Challenge® proizvod koji se može nositi s izazovima?

- // primjena u brojnim povrtlarskim kulturama
- // suzbija širok spektar najznačajnijih korova (širokolisnih i uskolistnih)
- // neovisan o vremenskim uvjetima
- // dugotrajno djelovanje
- // iznimno kompatibilan s herbicidnim partnerima
- // bez ograničenja u plodoredu



Challenge® 600

HRAC grupa "32"

Challenge® 600 je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolistnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u povrćarstvu, ratarstvu i aromatičnom bilju.

Kultura:

krumpir, češnjak, luk kozjak, mrkva, celer, grašak, bob, komorač, duhan, suncokret, začinsko bilje i sjemenski usjevi (lucerna, poriluk, grahorica, mrkva, celer, komorač, kopar, slanutak)

Aktivna tvar:

// aklonifen 600 g/l

Formulacija:

SC - koncentrat za suspenziju

NOVI ALAT U BORBI PROTIV KOROVA U KRUMPIRU I POVRĆU

Mali broj registriranih te ukidanje postojećih herbicida u povrću postavlja proizvođače pred brojne izazove. S herbicidom Challenge® donosimo izvrsno rješenje protiv najvažnijih korova i više sigurnosti za proizvođače krumpira i povrća.

Challenge® je herbicid s fleksibilnim načinom primjene pre-em i post-em. Djeluje na korove u nicanju te iako djeluje preko tla Challenge nije ovisan o oborinama, a rezidualno djelovanje na korove zadržava i do 2 mjeseca nakon primjene. Nakon primjene ne obavljati naknadne mehaničke zahvate.



// HERBICID



// HERBICID



Equip®

HRAC MoA grupa "2"

Equip® OD sistemični je herbicid za suzbijanje uskolisnih i nekih širokolistih korova u kukuruzu. Sadrži okvašivač i zaštitnu tvar te je izuzetno siguran za kukuruz. Equip® je pravi izbor protiv višegodišnjih travnih korova rizomskog sirkia i pirike.

Kultura:
kukuruz

Aktivna tvar:
// forumsulfuron 22,5 g/l

Formulacija:
OD – uljna disperzija

Doza primjene:
2,0–2,5 l/ha

Karenca:
osigurana vremenom primjene

NAJBOLJI IZBOR ZA SVE TRAVNE KOROVE

// Equip® je najdjelotvorniji kada su korovi u aktivnom rastu. Najosjetljiviji stadiji korova su: divlji sirak iz sjemena u fazi 3–5 listova, divlji sirak iz rizoma i pirika u fazi 10–15 cm visine te jednogodišnje travne vrste, poput koštana u fazi 1–3 lista i jednogodišnje širokolistne vrste, poput ambrozije do 2 lista.

// Potrošnja vode ne smije biti veća od 300 l/ha.

// Za proširenje spektra djelovanja na širokolistne korove, Equip se može kombinirati s herbicidom Laudis® (Equip® 1,5 l/ha + Laudis® 1 l/ha).

// Za proširenje djelovanja na višegodišnje širokolistne korove, osjak i slak, preporučuje se miješati s herbicidom Oizysa® (Equip® 2-2,25 l/ha + Oizysa® 0,3-0,5 L/ha)

PRIMJENA:

Equip® OD primjenjuje se nakon nicanja kukuruza i korova u stadiju 2–6 listova kukuruza u dozi 2–2,5 l/ha, uz upotrebu vode od 200–300 l/ha. Equip® OD na istoj se površini tijekom vegetacije može koristiti jednokratno, u dozi od 2–2,5 l/ha. Doza od 2 l/ha primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova, dok se doza od 2,5 l/ha primjenjuje za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova.

Equip® učinkovito suzbija:

// **jednogodišnje uskolisne korove:** svračicu (*Digitaria sanguinalis*), koštanu (*Echinochloa crus-galli*), muharike (*Setaria spp.*), divlji proso (*Panicum spp.*)

// **višegodišnje uskolisne korove:** divlji sirak (*Sorghum halepense*), piriku (*Elymus repens*)

// **jednogodišnje širokolistne korove:** mračnjak (*Abutilon theophrasti*), šćir (*Amaranthus spp.*), limundžik, partizanku ili ambroziju (*Ambrosia elatior*)

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

// Izvrsno suzbija višegodišnje uskolisne korove.

// Već 2 sata nakon primjene otporan je na ispiranje kišom.

// Sadrži zaštitnu tvar (safener) koja omogućuje fleksibilniju primjenu uz više sigurnosti za usjev.

// Sadrži okvašivač.



PRIMJENA:

Hussar® OD primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolistih i uskolisnih korova te nekih višegodišnjih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu te raži i pšenoraži u dozi 0,1 l/ha. Preporučena količina vode je 200–300 l/ha. Hussar® OD suzbija sljedeće uskolisne korove: bijela rosulja (*Agrostis gigantea*), obična slakoperka (*Apera spica venti*), ljlul (*Lolium spp.*), svjetlice (*Phalaris spp.*), jednogodišnja vlasnjača (*Poa annua*) i obična vlasnjača (*Poa trivialis*).

Hussar® OD suzbija sljedeće uskolisne korove: bijela rosulja (*Agrostis gigantea*), obična slakoperka (*Apera spica venti*), ljluljevi (*Lolium spp.*), svjetlice (*Phalaris spp.*), jednogodišnja vlasnjača (*Poa annua*), obična vlasnjača (*Poa trivialis*);

Hussar® OD suzbija sljedeće širokolistne korove: hrapavi šćir (*Amaranthus retroflexus*), poljska krika (*Anagallis arvensis*), jarmani (*Anthemis spp.*), pepeljuge (*Atriplex spp.*), zrakasta smrdulja (*Bifora radians*), obična rusomača (*Capsella bursa-pastoris*), modri različak (*Centaurea cyanus*), bijela loboda (*Chenopodium album*), poljski osjak (*Cirsium arvense*), šupljozubi (*Galeopsis spp.*), sitnocvjetna konica (*Galinsoga ciliata*), ljepljiva broćika (*Galium aparine*), mrtve koprive (*Lamium spp.*), kamilice (*Matricaria spp.*), poljska potočnica (*Myosotis arvensis*), divlji mak (*Papaver rhoeas*), dvornici (*Polygonum spp.*), poljski žabnjak (*Ranunculus arvensis*), divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*), štavelji (*Rumex spp.*), obični kostrš (*Senecio vulgaris*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), svinjak (*Sonchus sp.*), srednja mišjakinja (*Stellaria media*), djeteline (*Trifolium spp.*), grahorice (*Vicia spp.*), ljubice (*Viola spp.*), samonikla uljana repica.

Hussar® OD primjenjuje se u proljeće na korove u intenzivnom rastu. Potrebno je tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice na ozimoj pšenici, ozimom ječmu, raži i pšenoraži te od trećeg lista do kraja busanja u jaroj pšenici i jarom ječmu. Najbolji rezultati se postižu kada su uskolisni korovi u fazi 2–4 lista, a širokolistni u fazi 2–6 listova.

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

// Gotova kombinacija koja suzbija najznačajnije uskolisne i širokolistne korove.

// Fleksibilan.

// Siguran i jednostavan za korištenje.



hussar^{OD}

HRAC grupa "2"

Hussar® OD sistemični je herbicid koji na jednostavan i fleksibilan način suzbija sve najznačajnije uskolisne i širokolistne korove u žitaricama.

Kultura:
ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam, raž, pšenoraž

Aktivna tvar:
// jodosulfuron 100 g/l

Formulacija:
OD – uljna disperzija

Doza primjene:
// ozima i jara pšenica: 0,1 l/ha
// ozimi i jari ječam: 0,1 l/ha
// raž: 0,1 l/ha
// pšenoraž: 0,1 l/ha

Karenca:
osigurana vremenom primjene

FLEKSIBILAN I EKONOMIČAN

// Najbolje suzbija slakoperku - od stadija nicanja do stadija 3 lista

// Za optimalan učinak preporučuje se dodatak okvašivača.

// Nakon tretmana Hussarom, temperatura zraka ne smije u roku od 24 sata pasti 0°C.

// Već 2 sata nakon primjene otporan je na ispiranje kišom.

// Sadrži zaštitnu tvar.

// Može se miješati s fungicidima.

// Hussar® OD se na istoj površini može primijeniti jednom u vegetaciji.



hussar® Star

HRAC MoA grupa "2"

Hussar® Star je herbicid namijenjen suzbijanju obične slakoperke (*Apera spica-venti*), divlje zobi (*Avena fatua*), višegodišnjeg ljlula (*Lolium perenne*) te jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih korova u ozimim žitaricama.

Kultura:

pšenica, pšenoraž i raž

Aktivna tvar:

// jodosulfuron 33 g/kg
// tienkarbazon-metil 25 g/kg

Formulacija:

WG - vododispersirajuće granule

Doza primjene:

0,2-0,3 kg/ha uz dodatak okvašivača MERO u količini 1l/ha

Karenca:

osigurana vremenom primjene

NOVA ZVIJEZDA ZA VIŠE PRINOSE

// Izvrsno suzbija širokolistne korove.

// Za optimalan učinak preporučuje se dodatak okvašivača Mero.

// Dvije aktivne tvari, širi spektar djelovanja na korove.

PRIMJENA:

HUSSAR® STAR primjenjuje se u stadiju od početka busanja do stadija drugog koljenca (BBCH 21-32) U KOLIČINI OD 0,2-0,3 kg/ha. Za poboljšanje učinka dodaje mu se MERO u količini od 1,0 L/ha. Hussar® Star suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolistne korove.

HUSSAR® STAR u količini od 0,2 kg/ha: - odlično suzbija (>95 %) poljski jarmen (*Anthemis arvensis*), sofijin oranž (*Descurainia sophia*), običnu dimnjaču (*Fumaria officinalis*), broćike (*Galium spp.*), mrtve koprive (*Lamium spp.*), dvornike (*Polygonum spp.*), bršljenastu čestoslavicu (*Veronica hederifolia*); - vrlo dobro suzbija (85-94,9 %) slakoperku (*Apera spica-venti*), divlju zob (*Avena fatua*), višegodišnji ljlul (*Lolium perenne*), pastirsку torbicu (*Capsella bursa-pastoris*), različak (*Centaurea cyanus*), poljski mak (*Papaver rhoeas*); - dobro suzbija (75-84,9 %) poljski osjak (*Cirsium arvense*).

HUSSAR® STAR u količini od 0,3 kg/ha: - odlično suzbija (>95 %) slakoperku (*Apera spica-venti*), poljski jarmen (*Anthemis arvensis*), pastirsку torbicu (*Capsella bursa-pastoris*), sofijin oranž (*Descurainia sophia*), običnu dimnjaču (*Fumaria officinalis*), broćike (*Galium spp.*), mrtve koprive (*Lamium spp.*), dvornike (*Polygonum spp.*), poljski mak (*Papaver rhoeas*), bršljenastu čestoslavicu (*Veronica hederifolia*); - vrlo dobro suzbija (85-94,9 %) divlju zob (*Avena fatua*), višegodišnji ljlul (*Lolium perenne*), različak (*Centaurea cyanus*); - dobro suzbija (75-84,9 %) poljski osjak (*Cirsium arvense*).

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

// Snažnije djelovanje na uskolistne korove (*Apera spica-venti*).

// Dodatno zemljisko djelovanje.

// Potpuna sigurnost za uzgajanu kulturu.

PRIMJENA:

PRIMJENA:

Laudis® se koristi za suzbijanje uskolistnih i širokolistnih korova nakon nicanja kukuruza i korova u razvojnoj fazi 2-8 listova kukuruza. Sredstvo se primjenjuje u dozi 2,25 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Laudis® se tijekom jedne vegetacije na istoj površini može koristiti jednokratno ili dvokratno u razdvojenoj (split) aplikaciji. Optimalno vrijeme primjene je kada većina korova iznikne.

U slučaju da je nicanje korova produženo, Laudis® se može koristiti dvokratno (split aplikacija) u razmaku 7-10 dana. Zajedno, u oba tretmana, doza ne smije prelaziti 2,25 l/ha. Preporučena doze primjene: 1,125 l/ha za prvo tretiranje i 1,125 l/ha za drugo tretiranje.

NEZAMJENJIV ALAT U BORBI PROTIV REZISTENTNOG SIRKA

Praksa je pokazala da je Laudis® nezamjeniv u strategiji suzbijanja sirka koji je rezistentan na sulfonilurea herbicide (ALS inhibitore). U slučaju rezistentnog sirka sljedeća je preporuka za primjenu herbicida:


1. Rani post-em: Adengo 0,44 l/ha BBCH 12-13 (najbolji rezultat postiže se ukoliko rizomski sirak već izade van)
2. Post em: Laudis 2,25 l/ha BBCH 14-16 (10-14 dana nako primjene Adenga prije nego se rizomski sirak počen oporavljati)

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

// Neovisan je o vremenskim uvjetima.

// Neovisan je o uzrastu korova.

// Neovisan je o uzrastu kukuruza.



LAUDIS®

HRAC grupa "27"

Laudis® je herbicid koji osigurava najfleksibilniju i najsigurniju zaštitu od svih najznačajnijih korova u kukuruzu, jednim prohodom u post-em tretmanu.

Kultura:

kukuruz

Aktivna tvar:

// tembotron 44 g/l

Formulacija:

OD – uljna disperzija

Doza primjene:

2,25 l/ha

Karenca:

osigurana vremenom primjene

BEZ OGRANIČENJA

// Iskustva pokazuju da dozom 2 l/ha postižemo optimalne rezultate.

// Iskustva pokazuju da izvrsno suzbija abutilon i pri visini od 50 cm.

// Izvrsno suzbija koštan koji je izbusao.

// U praksi se pokazao kao jedini herbicid koji odlično suzbija troškot ili pužajuću piriku.

// Za poboljšanje učinka na slak može se kombinirati s herbicidima na osnovi dikambe, a za poboljšanje djelovanja na muhare i svračicu s herbicidom Equip® (Laudis® 1 l/ha + Equip® 1,5 l/ha).

// Već 1 sat nakon primjene ga kiša ne može isprati.

// Sadrži zaštitnu tvar te je potpuno siguran za usjev.



MONSOON® active

PRIMJENA:

Za suzbijanje jednogodišnjih uskolistih i jednogodišnjih širokolistih korova jednokratno u količini 1,5 l/ha ili razdvojenom (*split*) primjenom dvokratno u količini 0,75 l/ha (2 x 0,75 l/ha) uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Za suzbijanje divljeg sirka (*Sorghum halepense*) jednokratno u količini 2 l/ha ili razdvojenom (*split*) primjenom dvokratno u količini 1 l/ha (2 x 1 l/ha) uz utrošak vode 200-400 l/ha.

// u slučaju višegodišnjih širokolistih korova (slak, osjak) preporučuje se miješati s herbicidom Oizysa® (Monsoon® Active 1,5 l/ha + Oizysa® 0,3-0,5 L/ha)

Sredstvo se u punoj količini i jednokratnoj primjeni primjenjuje u stadijima razvoja 2-6 listova kukuruza (BBCH 12-16). Širokolistne korove tretirati u stadijima razvoja 2-5 listova (BBCH 12-15), a uskolistne od stadija 2 lista od početka busanja (BBCH 12-21).

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

// Izvrsna efikasnost na divlji sirak (iz sjemena i rizoma), kao i ostale travne korove.

// Sigurno rješenje u suzbijanju velikog broja širokolistih korova.

// Snažno djelovanje preko lista i produženo djelovanje preko zemljišta na sve korove.

// Brzo usvajanje i otpornost na ispiranje kišom.

// Bez ograničenja u plodoredu.



HRAC MoA grupa "2"

Monsoon® Active je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju divljeg sirka (*Sorghum halepense*), jednogodišnjih uskolistih i jednogodišnjih širokolistih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Kultura:

kukuruz

Aktivna tvar:

// foramsulfuron 31,5 g/l
// tienkarbazon-metil 10 g/l

Formulacija:

OD – uljna disperzija

Doza primjene:

// jednogodišnji uskolistni i širokolistni korovi 1,5 l/ha
// divlji sirak 2 l/ha

Karenca:

60 dana

ONO ŠTO STE ODUVIJEK ŽELJELI

// Optimalan učinak na sve najznačajnije korove, uključujući abutilon i rizomski sirak, postižemo dozom 1,8 l/ha.

// Ukoliko je velika zakoravljenost rizomskim sirkom, koristiti 2 l/ha.

// Folijarno suzbija sve izniknule korove, dok zemljivo pod kontrolom drži sve one koji će naknadno nicići.

// Jedini post-em herbicid koji ima zemljivo djelovanje na travne korove.

// Nakon primjene korovi odmah prestaju s rastom, a prvi simptomi na korovima vidljivi su nakon 7-14 dana. Potpuno odumiranje korova nastupa nakon 3-4 tjedna.

// Najučinkovitiji je na korove u aktivnom rastu, kada se i simptomi djelovanja brže ispoljavaju.

// Usprkos sporijem odumiranju korova, konačna efikasnost je bolja od standardnih sulfonilurea herbicida.

HERBICID

PRIMJENA:

Dobro suzbija sljedeće korove: divlje lobode (*Atriplex spp.*), crvena mrtva kopriva (*Lamium purpureum*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), poljska gorusica (*Sinapis arvensis*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), zeljasti ostak (*Sonchus oleraceus*), trnovita dikica (*Xanthium spinosum*), obični ščir (*Amaranthus retroflexus*), bijela loboda (*Chenopodium album*) i poljski osjak (*Cirsium arvense*).

*Sredstvo se ne smije primijeniti na kukuru zu šećercu te kukuru zu namijenjenom za sjemensku proizvodnju. Primjenjuje se prskanjem pod niskim pritiskom i pritom treba paziti da se površina dobro prekrije.

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

// Odlična djelotvornost na višegodišnje širokolistne korove.

// Dobar partner u antirezistentnoj strategiji.

// Idealan partner za miješanje s drugim herbicidima.

// U slučaju višegodišnjih korova, u kombinaciji s Adengom®, Equipom® ili Monsoon® Activom dodajte 0,3 l/ha Oizysa®.

Oizysa® 480 SL

HRAC grupa "4"

Oizysa® 480 SL je sistemični herbicid za suzbijanje širokolistnih korova u kukuruzu.

Kultura:

kukuruz

Aktivna tvar:

// dikamba 480 g/l

Formulacija:

SL - koncentrat za otopinu

Doza primjene:

u količini od 0,5 l/ha u stadiju razvoja 1-6 listova kukuruza (BBCH 11-16) utrošak vode: 275 - 300 l/ha

Karenca:

Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu.
Radna zabrana: 24 sata

SAVRŠEN DODATAK

// Provjereno rješenje za višegodišnje širokolistne korove.

// Savršen partner našim proizvodima



Sekator[®] OD

HRAC MoA grupa "2"

Sekator[®] OD je najčešći izbor poljoprivrednih proizvođača. Nudi najbolji omjer uloženog i dobivenog. Uspješno suzbija najveći broj širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici te ozimom i jarom ječmu. Osigurava odličnu učinkovitost, jednostavnost i fleksibilnost primjene.

Kultura:
ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam

Aktivna tvar:
// amidosulfuron 100 g/l
// jodosulfuron-metil-natrij 25 g/l

Formulacija:
OD – uljna disperzija

Doza primjene:
// ozima i jara pšenica: 0,1-0,15 l/ha
// ozimi i jari ječam: 0,1-0,15 l/ha

Karenca:
osigurana vremenom primjene

OŠTRO PROTIV KOROVA

// Sadrži zaštitnu tvar te se u praksi pokazao kao iznimno siguran i pouzdan za primjenu sve do pojave zastavice.

// 2 sata nakon primjene ga kiša ne može isprati.

// Nakon tretmana Sekatorom, u roku od 24 h temperatura ne smiju pasti ispod 0°C.

// Može se miješati s fungicidima.

// Ne koristiti u postrnom žitu i zobi.

// Dozvoljena samo jedna primjena tijekom vegetacije.

PRIMJENA:

Sekator[®] OD je sistemični herbicid za suzbijanje nekih uskolisnih i većeg broja širokolisnih korova. Suzbija najveći broj širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici te ozimom i jarom ječmu u dozi 0,1–0,15 l/ha uz utrošak vode 200–300 l/ha. Vrijeme primjene je od početka busanja do razvijenog drugog koljenca i u jaroj pšenici i ječmu tretiranjem od fenofaze 3 lista do završetka busanja.

Sekator[®] OD suzbija neke uskolisne korove: slakoperku (*Apera spica venti*) i vlasnjaču (*Poa spp.*); ali posebno dobro djeluje na širokolisne korove, i to: hrapavi šćir (*Amaranthus retroflexus*), poljsku kriku (*Anagallis arvensis*), poljski jarmen (*Anthemis arvensis*), divlju lobodu (*Atriplex patula*), pastirsku torbicu (*Capsella bursa-pastoris*), bijelu lobodu (*Chenopodium album*), poljski osjak (*Cirsium arvense*), broćiku (*Galium aparine*), crvenu mrtvu koprivu (*Lamium purpureum*), kamilicu (*Matricaria spp.*), poljski mak (*Papaver rhoeas*), dvornike (*Polygonum spp.*), divlju rotkvu (*Raphanus raphanistrum*), poljsku gorušicu (*Sinapis arvensis*), malu mišjakinju (*Stellaria media*), poljski svinjak (*Sonchus arvensis*), čestoslavice (*Veronica haederifolia* i *V.persica*), ljubicu (*Viola spp.*) i samoniklu uljanu repicu (*Brassica napus*).

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

- // Učinkovito suzbija najširi spektar širokolisnih korova.
- // Fleksibilno i dugo vrijeme primjene.
- // Najbolji omjer uloženog i dobivenog.
- // Daje najviše mogućnosti proizvođaču za optimalno gospodarenje vremenom i resursima na gospodarstvu.
- // Siguran i jednostavan za korištenje.



PRIMJENA:

Krumpir: Prije nicanja krumpira (pre-em) u količini 0,9 l/ha ili nakon nicanja krumpira (post-em), kada je duljina izdanaka u prosjeku 5-10 cm, u količini 0,55 L/ha.

Ograničenje: dozvoljena je primjena sredstva na tlima u kojima je udio organskih tvari veći od 1%.

Rajčica: U rajčici iz sjemena sredstvo se primjenjuje u količini 0,55 l/ha u stadiju od 5-6 listova usjeva. U rajčici iz presadnika sredstvo se može primjenjivati prije sadnje ili poslije sadnje, nakon što se biljka dobro ukorjeni, u količini 0,55 l/ha.

Soja: Nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 0,55 l/ha.

Šparoga: U količini od 0,9 l/ha u etabliranom usjevu, u rano proljeće nakon zagranja, dok su izboji još ispod površine tla ili nakon sjetve na površini bez biljaka.

Mrkva*: Jednogodišnji širokolisni korovi

Jednokratna primjena u stadiju razvoja od 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini 0,35 l/ha. Dvokratna primjena u podijeljenoj (split) aplikaciji. Prvi puta primjeniti u stadiju razvoja 1-2 prava lista kulture (BBCH 11-12) u količini 0,08-0,12 l/ha, a drugi u stadiju razvoja 4-6 listova kulture (BBCH 14-16 u količini 0,12 – 0,20 l/ha). Maksimalan utrošak sredstva je 0,35 l/ha.

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

- // Prvi i jedini metribuzin u tekućem obliku.
- // Poboljšana tekuća formulacija čini primjenu jednostavnijom i sigurnijom.
- // Učinkovit na širok spektar najučestalijih širokolisnih korova i nekih uskolisnih korova u polju.
- // Osigurava produženo rezidualno (zemljivo) djelovanje.



sencor[®]

HRAC grupa: "5"

Sencor[®] SC 600 je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u krumpiru, soji, rajčici i šparogama.

Kultura:
krumpir, rajčica, soja, šparoge, mrkva

Aktivna tvar:
// metribuzin 600 g/l

Formulacija:
koncentrat za suspenziju (SC)

Doza primjene:
// krumpir (pre-em): 0,9 l/ha
// krumpir (post-em): 0,55 l/ha
// rajčica: 0,55 l/ha
// soja: 0,55 l/ha
// šparoge: 0,9 l/ha
// mrkva: 0,35 l/ha

Karenca:

7 dana za šparoge, osigurana vremenom primjene u krumpiru, rajčici i soji, 42 dana za mrkvu, pastrnjak i celer korjenaš

*Sredstvo odobreno za primjenu u malim namjenama/kulturama. Odgovornost za primjenu sredstva sukladno odobrenju na malim kulturama/namjenama u smislu učinkovitosti i/ili fitotoksičnosti preuzima korisnik sredstva.

FUNGICIDI





Ascra® Xpro

Ascra® Xpro je više od fungicida jer omogućuje savršenu kontrolu svih bolesti i uvjerljivo veći prinos.

Kultura:
pšenica, raž, pšenoraž, ječam, zob

Aktivna tvar:
// bixafen 65 g/l
// fluopiram 65 g/l
// protiokonazol 130 g/l

Formulacija:
EC - tekući koncentrat za emulziju

Doza primjene:
1 - 1,5*

Karenca:
osigurana vremenom primjene

* u praksi se u skladu s našim uvjetima proizvodnje preporučuje primjena u dozi od 1 - 1,2 L/ha ovisno o broju tretiranja u programu zaštite

PRIMJENA:

U pšenici za suzbijanje bolesti: parazitskog polijeganja (*Pseudocercosporella herpotrichoides*), snježne pljesni (*Microdochium nivale*), žute hrđe (*Puccinia striiformis*), smeđe hrđe (*Puccinia recondita*), smeđe pjegavosti lista (*Mycosphaerella graminicola* = *Septoria tritici*), smeđe pjegavosti pljevica (*Parastagonospora nodorum* = *Septoria nodorum*), pepelnice (*Erysiphe graminis*) i mrežaste pjegavosti (*Pyrenophora teres*) u dozi 1-1,5 l/ha primjenom od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Protiv fuzarijske paleži klasa (*Fusarium spp.* i *Microdochium nivale*) primjenjuje se u dozi 1 - 1,5 l/ha od početka klasanja do početka cvatnje.

U ječmu za suzbijanje bolesti: parazitskog polijeganja (*Pseudocercosporella herpotrichoides*), smeđe hrđe (*Puccinia hordei*), pepelnice (*Erysiphe graminis*), sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*), mrežaste pjegavosti (*Pyrenophora teres*), ramularijske pjegavosti (*Ramularia collo-cygni*) u dozi 1 - 1,2 l/ha, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na ječmu je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

U zobi za suzbijanje bolesti: pepelnice (*Erysiphe graminis*), narančaste hrđe (*Puccinia coronata f. sp. avenae*), parazitskog polijeganja (*Pseudocercosporella herpotrichoides*) u dozi 1,2 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na zobi je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

U raži za suzbijanje bolesti: pepelnice (*Erysiphe graminis*), smeđe hrđe (*Puccinia recondita*), sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*) i parazitskog polijeganja (*Pseudocercosporella herpotrichoides*). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1 - 1,5 l/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na raži je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

U pšenoraži za suzbijanje bolesti: sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*), smeđe pjegavosti lista (*Mycosphaerella graminicola* = *Septoria tritici*), smeđe pjegavosti pljevica (*Parastagonospora nodorum* = *Septoria nodorum*), smeđe hrđe (*Puccinia recondita*), pepelnice (*Erysiphe graminis*), fuzarijske paleži klasa (*Fusarium spp.*) i snježne pljesni (*Microdochium nivale*). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1 - 1,5 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na pšenoraži je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

PRIMJENA:

U ozimoj i jaroj pšenici za suzbijanje bolesti: pepelnice (*Blumeria graminis*), smeđe pjegavosti lista (*Septoria tritici* = *Mycosphaerella graminicola*), smeđe pjegavosti lista i pljevica (*Phaeosphaeria nodorum* = *Stagonospora nodorum*), žuto-smeđe pjegavosti lista (*Pyrenophora tritici-repentis*), žute hrđe (*Puccinia striiformis*), paleži klasa (*Fusarium spp.*), smeđe hrđe (*Puccinia recondita*) u količini 1,2-1,5 L/ha. Niža količina sredstva primjenjuje se kod manjeg pritiska bolesti. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Na pšenici su dozvoljene najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena.

U ozimom i jarom ječmu za suzbijanje bolesti: pepelnice (*Blumeria graminis*), mrežaste pjegavosti (*Pyrenophora teres*), sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*), ramularije (*Ramularia collo-cygni*), smeđe hrđe (*Puccinia hordei*), fuzarijske paleži klasa (*Fusarium spp.*) u količini 1,2-1,5 L/ha. Niža količina sredstva primjenjuje se kod manjeg pritiska bolesti. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Na pšenici su dozvoljene najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena.

U ozimoj i jaroj pšenoraži (Tritikale) za suzbijanje bolesti: pepelnice (*Blumeria graminis*), smeđe pjegavosti lista (*Septoria tritici* = *Mycosphaerella graminicola*), smeđe hrđe (*Puccinia recondita*) u količini 1,2-1,5 L/ha. Niža količina sredstva primjenjuje se kod manjeg pritiska bolesti. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Na pšenici su dozvoljene najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena.

U ozimom i jarom piru za suzbijanje bolesti: pepelnice (*Blumeria graminis*), smeđe pjegavosti lista (*Septoria tritici* = *Mycosphaerella graminicola*), smeđe pjegavosti lista i pljevica (*Phaeosphaeria nodorum* = *Stagonospora nodorum*), žuto-smeđe pjegavosti lista (*Pyrenophora tritici-repentis*), žute hrđe (*Puccinia striiformis*), paleži klasa (*Fusarium spp.*), smeđe hrđe (*Puccinia recondita*) u količini 1,2-1,5 L/ha. Niža količina sredstva primjenjuje se kod manjeg pritiska bolesti. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Na pšenici su dozvoljene najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena.

U ozimoj i jaroj raži za suzbijanje bolesti: pepelnice (*Blumeria graminis*), sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*), smeđe hrđe (*Puccinia secalis*) u količini 1,2-1,5 L/ha. Niža količina sredstva primjenjuje se kod manjeg pritiska bolesti. Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Na pšenici su dozvoljene najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena.



Delaro® FORTE

Delaro® Forte je fungicid namjenjen za suzbijanje bolesti lista i klasa pšenice i ječma.

Kultura:
pšenica, raž, pšenoraž, ječam, pir

Aktivna tvar:
// spiroksamin 107,00 g/l
// trifloksistrobin 80,00 g/l
// protiokonazol 93,30 g/l

Formulacija:
EC - tekući koncentrat za emulziju

Doza primjene:
1,2 – 1,5 L/ha

Karenca:
osigurana vremenom primjene





FALCON® Forte

Falcon® Forte je fungicid s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem za suzbijanje biljnih bolesti.

Kultura:
pšenica, pšenoraž, ječam, raž

Aktivna tvar:
// protiokonazol 53 g/l
// tebukonazol 148 g/l
// spiroksamín 224 g/l

Formulacija:
EC – tekući koncentrat za emulziju

Doza primjene:
// pšenica i pšenoraž 0,7-1 l/ha
// ječam 0,6-0,8 l/ha
// raž 0,6-0,8 l/ha

TROSTRUKA SNAGA

// Odlično suzbija bolesti lista na žitaricama.

// Ima kurativno, a na pepelnici i eradikativno djelovanje, što znači da može zaustaviti bolest u određenom stadiju razvoja.

PRIMJENA:

U pšenici i pšenoraži: za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe graminis*), hrđa (*Puccinia spp.*), smeđe pjegavosti lista (*Septoria spp.*), u dozi 0,8-1 l/ha smanjuje zarazu uzročnikom paleži klasa (*Fusarium spp.*).

U ječmu: za suzbijanje mrežaste pjegavosti (*Pyrenophora teres*), pepelnice (*Erysiphe graminis*) i sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*) u dozi od 0,8 l/ha

U raži: za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe graminis*), hrđa (*Puccinia spp.*), smeđe pjegavosti lista (*Septoria spp.*), u dozi 0,8-1 l/ha smanjuje zarazu uzročnikom paleži klasa (*Fusarium spp.*).

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

- // Djeluje preventivno, kurativno i eradikativno (pepelnica).
- // Odlično djelovanje na bolesti lista i pri nižoj temperaturi zraka u rano proljeće.
- // Može se miješati s herbicidima za proljetnu primjenu (Hussar® i Sekator®).
- // Osigurava zdravo i duže zeleno lišće.



PRIMJENA:

U pšenici: za suzbijanje pepelnice (*Blumeria graminis*) i smeđe pjegavosti lišća i pljevica (*Septoria spp.*) u dozi 0,75-1,0 l/ha, te hrđe (*Puccinia spp.*) u dozi 0,5 l/ha. Smanjuje zarazu uzročnikom paleži klasa (*Fusarium spp.*)

U ječmu: za suzbijanje mrežaste pjegavosti (*Pyrenophora teres*), pepelnice (*Blumeria graminis*) i sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*) u dozi 1,0-1,5 l/ha, te hrđe (*Puccinia spp.*) u dozi 0,5 l/ha.

U raži i zobi: za suzbijanje hrđe (*Puccinia spp.*), pepelnice (*Blumeria graminis*), sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*) i pjegavosti lišća zobi (*Septoria avenae*) u dozi 0,5 l/ha.

U uljanoj repici: za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*), bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) i koncentrične pjegavosti (*Alternaria spp.*) u dozi 1,5-2,0 l/ha.

U suncokretu: za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) i sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u dozi 1,5 l/ha (15 ml na 100 m²), te hrđe suncokreta (*Puccinia helianthi*) u dozi 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²). Prvi put primjenjujemo u vrijeme butonizacije, a drugi put u prvoj polovici cvatnje.

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

- // Praksa pokazuje da primjenjen u uljanoj repici u jesen, djeluje kao regulator rasta (smanjuje rast nadzemne mase).
- // Uljana repica bolje prezimljuje, manje su štete od izmrzavanja.
- // Dozrijevanje uljane repice je ujednačeno, polijeganje smanjeno, a žetva olakšana.
- // Širok spektar djelovanja u različitim kulturama.
- // Može se miješati s insekticidima.



Folicur®

Folicur® EW 250 je sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti.

Kultura:
uljana repica, pšenica, ječam, raž, zobi, suncokret

Aktivna tvar:
// tebukonazol 250 g/l

Formulacija:
EW – koncentrat za emulziju

Doza primjene:
// uljana repica: 1,5-2,0 l/ha
// žitarice: 0,5-1 l/ha
// suncokret: 0,5-1,5 l/ha

Karenca:
56 dana za uljanu repicu i suncokret, 42 dana za žitarice

OSLONAC KVALITETE

// U jesen se primjenjuje kada uljana repica ima razvijenih 4-5 listova u dozi 0,5 l/ha. Za svaki dodatni list povećava se doza za 0,1 l/ha do maksimalno 1,5 l/ha.

// Može se koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini.

// U žitaricama i uljanoj repici moguće je miješanje s insekticidom Decis®.



INFINITO®

Infinito® je sistemičan fungicid s preventivnim djelovanjem protiv plamenjače krumpira, lisnatog povrća, kupusnjača i tikvenjača. Otporan na ispiranje kišom te fleksibilan za primjenu, omogućava najbolju zaštitu od infekcije u vrijeme intenzivne vegetacije.

Kultura:

krastavac, tikvice, dinja, lubenica, bundeva, salata glavatica, bijeli i crveni kupus, cvjetača, brokula, kelj pupčar, luk, krumpir

Aktivna tvar:

// propamokarb (62,5 g/l),
// fluopikolid (625 g/l)

Formulacija:

SC - koncentrat za suspenziju

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

// Brzo se usvaja i raspoređuje po biljci.

// Osigurava dugotrajno djelovanje primijenjen u blok tretmanu.

// Neovisan o vremenskim uvjetima i otporan na ispiranje kišom vec sat vremena nakon primjene.

// Sigurno štiti nadzemne i podzemne organe biljke.

// Štiti gomolje od plamenjače prije „vađenja“ te smanjuje mogućnost pojave bolesti tijekom skladištenja.

// U usjevima koji se navodnjavaju, preporučujemo primjenu Infinita® prije irigacije.

// Ne ostavlja tragove/mrlje primjene na kulturi i time ne ugrožava tržišnu vrijednost plodova.

// Kompatibilan u tank-mixu s drugim sredstvima.

// Proizvod kratke karence i niskih rezidua propisanih standardima EU.

PRIMJENA:

Krumpir: Plamenjača (*Phytophthora infestans*); primijeniti u količini 1,2-1,6 l/ha od perioda zatvaranja redova unutar usjeva pa do kraja vegetacije uz utrošak škropiva 1000 l/ha s razmakom od 7 do 12 dana.

Broj primjena: 4x; **Karenca:** 7 dana.

Krastavac, tikvice, dinja, lubenica (OP i ZP), bundeva:

Plamenjača (*Phytophthora cubensis*) primijeniti u količini 1,2 – 1,6 l/ha tijekom vegetacije uz utrošak škropiva 1000 l/ha. Primijeniti u razmacima od 7 do 12 dana.

Broj primjena: (OP) 2x, (ZP) 3x;

Karenca: krastavac, tikvice, dinja, lubenica i bundeva 3 dana (OP), tikvice i krastavac (ZP) 1 dan.

Salata glavatica (OP i ZP): Plamenjača (*Bremia lactucae*) primjena nakon trećeg pravog lista pa do kraja vegetacije uz poštivanje karence u količini 1,4-1,6 l/ha uz utrošak škropiva 1000 l/ha.

Broj primjena: 1x (OP), 2x (ZP),

Karenca: 7 dana (OP), 14 dana (ZP).

Bijeli i crveni kupus, cvjetača, brokula, kelj pupčar*: Plamenjača (*Peronospora spp.*) primijeniti u količini 1,6 l/ha od formiranja prvih pravih listova do formiranja glavica, uz utrošak škropiva 1000 l/ha. Primijeniti u razmacima od 7 do 12 dana.


Broj primjena: crveni i bijeli kupus 3x, cvjetača i brokula 3x, kelj pupčar 1x, **Karenca:** 14 dana za sve navedene kulture.

Luk*: Plamenjača luka (*Peronospora spp.*) primijeniti u količini 1,6 l/ha, u razmaku od 7 dana i stadiju razvoja od trećeg vidljivog lista do faze početka propadanja listova.

Broj primjena: 2x; **Karenca:** 7 dana.

*Sredstvo odobreno za primjenu u malim namjenama/kulturama.

Odgovornost za primjenu sredstva sukladno odobrenju na malim kulturama/namjenama u smislu učinkovitosti i/ili fitotoksičnosti preuzima korisnik sredstva.



PRIMJENA:

U uljanoj repici: za suzbijanje suhe truleži (*Leptosphaeria maculans* = *Phoma lingam*), bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*), koncentrične pjegavosti (*Alternaria brassicae*, *A. brassicicola*), pepelnice (*Erysiphe cruciferarum*), svijetle pjegavosti (*Pyrenopeziza brassicae*) i bijele pjegavosti (*Mycosphaerella capsellae* = *Pseudocercospora capsellae*). Sredstvo se primjenjuje u količini 1 l/ha, uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Na uljanoj repici dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacije.

U suncokretu: za suzbijanje crna pjegavost (*Phoma macdonaldii* = *Leptosphaeria lindquistii*), siva pjegavost (*Phomopsis helianthi* = *Diaporthe helianthi*), bijela trulež (*Sclerotinia sclerotiorum*), koncentrična pjegavost (*Alternaria helianthi*), siva plijesn (*Botrytis cinerea*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija 6 razvijenih listova do kraja cvatnje (BBCH 16-69), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana.

U kukuruzu: žuta pjegavost (*Kabatiella zeae*), siva pjegavost (*Exserohilum turicum* = *Helminthosporium turicum*), pjegavost lišća (*Bipolaris zeicola* = *Helminthosporium carbonum*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8-1,0 L/ha, od stadija porasta stabljike do kraja cvatnje (BBCH 30-69), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 14 dana. Dodatne informacije: Plodored: 12 mjeseci nakon primjene sredstva Propulse® smije se sijati/saditi korjenasto, gomoljasto i lisnato povrće, dok se 4 mjeseca nakon primjene smiju sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo Propulse® trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

U krumpiru: za suzbijanje koncentrične pjegavosti (*Alternaria solani*, *Alternaria alternata*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,5 L/ha, od početka zametanja gomolja (bubreženje prvog vrha stolona) do pune zriobe gomolja (BBCH 40-89), uz utrošak vode 100-400 L/ha. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacije s najmanjim razmakom između primjena od 10 dana.

U šećernoj repi: za pjegavosti lista šećerne repe (*Cercospora beticola*), pepelnice (*Erysiphe beta*), sive pjegavosti (*Ramularia beticola*), hrđe (*Uromyces betae*) i žute pjegavosti lista (*Stemphylium beticola*). Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 L/ha, od početka zatvaranja redova do tehnološke zriobe korijena (BBCH 31-49), uz utrošak vode 150-400 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, s najmanjim razmakom između primjena od 21 dan.



PROPULSE®

Propulse® je sistemični fungicid za suzbijanje uzročnika bolesti uljane repice, suncokreta, kukuruza, krumpira i šećerne repe

Kultura:

uljana repica, sunockret, kukuruz, krumpir i šećerna repa

Aktivna tvar:

// fluopiram 125 g/l
// protiokonazol 125 g/l

Formulacija:

SE – suspo emulzija

Doza primjene:

// uljana repica: 1 l/ha
// sunockret: 0,8-1 l/ha
// kukuruz: 0,8-1 l/ha
// krumpir: 0,5 l/ha

Karenca:

56 dana za uljanoj repici, 28 dana za sunockret, za kukuruz: osigurana vremenom primjene, 21 dan za krumpir

ZLATA VRIJEDAN

// Najbolje rezultate protiv bijele truleži postižemo primjenom kada je repica u 30% cvatnje.

// 30% cvatnje je kada je na glavnoj stabljici otvoreno 20 i više cvjetova.

// Propulse® je fungicid koji ima dovoljno dugo djelovanje te primjenjen u cvatnji štiti i od koncentrične pjegavosti, koja najveće štete čini na komuškama.



PROSARO®

Prosaro® 250 EC je kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje najšireg spektra biljnih bolesti u žitaricama i uljanoj repici. Prosaro je fungicid koji omogućuje više i kvalitetnije prinose.

Kultura:
pšenica, ječam, ozima raž, zob, uljana repica

Aktivna tvar:
// tebukonazol 125 g/l
// protiokonazol 125 g/l

Formulacija:
EC – tekući uljni koncentrat za emulziju

Doza primjene:
// pšenica: 0,75–1,0 l/ha
// ječam: 0,75–1,0 l/ha
// ozima raž: 1,2 l/ha
// zob: 1,0 l/ha
// uljana repica: 1,0 l/ha

Karenca:
42 dana za pšenicu i ječam, 56 dana za uljanu repicu, osigurana vremenom primjene u ozimoj raži i zobi

VI NE MOŽETE UVIJEK BITI TU, PROSARO MOŽE

// Na pšenici i ječmu protiv fuzarijske paleži klasa primjenjuje se na samom početku cvatnje, kod prvih vidljivih prašnika.

// Za optimalan učinak preporučuje se primjena prije najavljenih obořina.

// Prosaro® se na istoj površini može koristiti najviše 2 puta tijekom vegetacije.

// FUNGICID

PRIMJENA:

U pšenici: za suzbijanje pepelnice (*Blumeria graminis*), hrđe (*Puccinia recondita*), smeđe pjegavosti lista pšenice (*Mycosphaerella graminicola*) te za smanjenje zaraza uzrokovanih fuzarijskom paleži klasa (*Fusarium spp.*) u dozi 0,75–1,0 l/ha uz upotrebu vode 200–400 l/ha.

U ječmu: za suzbijanje pepelnice (*Blumeria graminis*), hrđe (*Puccinia hordei*), sive pjegavosti lista (*Rhynchosporium secalis*), mrežaste pjegavosti (*Pyrenophora teres*), u dozi 0,75–1 l/ha uz upotrebu vode 200–400 l/ha.

U ozimoj raži: za suzbijanje sive pjegavosti lista (*Rhynchosporium secalis*), smeđe hrđe (*Puccinia recondita*), pepelnice (*Blumeria graminis*) te za smanjenje pojave parazitskog polijeganja (*Tapesia spp.*) u dozi 1,2 l/ha uz potrebu vode 200–400 l/ha. Primijeniti najkasnije do mliječne zriobe preventivno ili odmah nakon pojave prvih simptoma.

U zobi: za suzbijanje narančaste hrđe (*Puccinia coronata*), pepelnice (*Blumeria graminis*) te za smanjenje pojave parazitskog polijeganja (*Tapesia spp.*) u dozi 1 l/ha uz upotrebu vode 200–400 l/ha; za suzbijanje narančaste hrđe sredstvo se primjenjuje odmah nakon pojave prvih znakova bolesti; u slučaju ponovljene zaraze sredstvo se može ponovo primijeniti nakon 2–3 tjedna; ako se primjenjuje kod uznapredovale zaraze, djelovanje sredstva će biti slabije; za suzbijanje pepelnice, sredstvo se primjenjuje odmah nakon pojave prvih znakova bolesti; ako pritisak bolesti ostane visok, primjena se može ponoviti; za smanjenje pojave parazitskog polijeganja potrebno je tretirati u proljeće, odmah nakon pojave znakova bolesti od početka vlatanja do pojave drugog koljenja.

U uljanoj repici: za suzbijanje suhe truleži korijena i stabljike (*Phoma spp.*), bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) i svjetle pjegavosti (*Pyrenopeziza brassicae*) u količini 1 l/ha; za suzbijanje suhe truleži korijena i stabljike sredstvo se primjenjuje u jesen, odmah nakon pojave prvih znakova bolesti; ponoviti primjenu u kasnu jesen/zimu ako se simptomi bolesti vrte; za suzbijanje bijele truleži sredstvo se primjenjuje u ranoj fazi cvatnje ili u punom cvatu; za suzbijanje svjetle pjegavosti sredstvo se primjenjuje preventivno u jesen/zimu (obično od kraja listopada do početka prosinca); naknadno prskanje može biti potrebno u rano proljeće kada počinje izduživanje stabljike, ovisno o razvoju bolesti.

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

// Standard protiv fuzarijske paleži klasa - smanjuje sadržaj mikotoksina u zrnu i osigurava kvalitetu prema standardima mlinarske i prehrambene industrije.

// Osigurava kvalitetan prinos: produžava vegetaciju te na taj način povećava tržišnu vrijednost usjeva s najboljim povratom investicije.

// Štiti listove od svih najznačajnijih bolesti.



Vaš partner u proizvodnji



INSEKTICIDI



PRIMJENA:

U pšenici, ječmu, zobi i raži: lisnih uši (*Aphis spp.*), sovice pozemljuše (*Agrotis spp.*) u količini 0,075-0,125 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha kod prve pojave štetnika. Dozvoljena je samo jedna primjena tijekom vegetacije.

U kukuruzu: kukuruzni moljac (*Ostrinia nubilalis*), kukuruzna sovica (*Sesamia nonagrioides*), žuta kukuruzna sovica (*Helicoverpa (Heliothis) armigera*), sovice (*Spodoptera spp.*), sovice pozemljuše (*Agrotis spp.*), lisne uši (*Aphis spp.*), kukuruzna zlatica (*Diabrotica virgifera*) u količini 0,125 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha, kod prve pojave štetnika. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7-14 dana.

U šećernoj repi: crna repina (bobova) uš (*Aphis fabae*), zelena breskvina uš (*Myzus persicae*), repin buhač (*Chaetocnema tibialis*), sovice (*Spodoptera spp.*), sovice pozemljuše (*Agrotis spp.*), repina muha (*Pegomyia betae*), repin štitasti kornjaš (*Cassida nebulosa*) u količini 0,075-0,125 l/ha u 200-400 litara vode kod prve pojave štetnika. Dozvoljena je samo jedna primjena tijekom vegetacije.

U krumpiru: krumpira zlatica (*Leptinotarsa decemlineata*) u količini 0,125 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha kod prve pojave štetnika. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

U uljanoj repici: repičina pipa komušarica (*Ceutorhynchus assimilis* syn. *Ceutorhynchus obstrictus*), repičina mušica komušarica (*Dasyneura brassicae*), repičin sjajnik (*Meligethes aeneus*), kupusni buhači (*Phyllotreta spp.*), repičin crvenoglavi buhač (*Psylliodes chrysocephala*)

Primjena: u količini 0,075 l/ha. Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.

U kukuruzu šećercu*: kukuruzni moljac (*Ostrinia nubilalis*), kukuruzna sovica (*Sesamia nonagrioides*), žuta kukuruzna sovica (*Helicoverpa armigera*), sovice pozemljuše (*Agrotis spp.*), sovice (*Spodoptera spp.*), sremzina lisna uš (*Rhopalosiphum padi*), zobena lisna uš (*Sitobion avenae*), 0,075-0,125 l/ha kod prve pojave štetnika. Kukuruzna zlatica (*Diabrotica virgifera virgifera*) 0,125 l/ha kod prve pojave štetnika.

PREDNOSTI PRIPRAVKA:

// Iznimno brzo djelovanje.

// Širok broj primjene u različitim kulturama.

// Snažno se veže na površinski dio biljke, jače i bolje od bilo kojeg piretroida na tržištu.

// Smanjena je mogućnost od ispiranja kišom.

// Minimalno je opasan za pčele zbog izvjesnog repellentnog djelovanja.

// Može se kombinirati s pripravcima Prosaro®, Falcon® Forte i Asgra®, kao i s ostalim fungicidima iz Bayerove palete proizvoda.

SREDSTVO JE DOSTUPNO I U PAKIRANJU OD 1 L

*Sredstvo odobreno za primjenu u malim namjenama/kulturama. Odgovornost za primjenu sredstva sukladno odobrenju na malim kulturama/namjenama u smislu učinkovitosti i/ili fitotoksičnosti preuzima korisnik sredstva.



Decis® 100 EC je insekticid kontaktnog i želučanog djelovanja s primjenom u velikom broju kultura u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu, na maslini, lucerni, industrijskom i ukrasnom bilju.

Kultura:

uljana repica, pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž, krumpir, šećerna repa, kukuruz i kukuruz šećerac*

Aktivna tvar:

// deltametrin 100 g/l

Formulacija:

koncentrat za emulziju

Doza primjene:

0,075-0,125 l/ha

Karenca:

30 dana za šećernu repu, ciklu, kukuruz, pšenicu, ječam, zob i raž, 14 dana za lucernu i krumpir, 3 dana za kukuruz šećerac*

VAŠA ODLUKA - VAŠ USPJEH

// Žitni balac može lako u toplim i vlažnim godinama u kratkom vremenu prouzročiti velike ekonomski štete na usjevu. Tretiranje obaviti protiv odraslih oblika i ličinki kada se dosegne prag štetnosti: 1-1,5 ličinka po zastavici.

// Decis® se ne smije koristiti pri visokoj temperaturi zraka (iznad 28°C), jer je vrlo hlapljiv.



BIOLOŠKI PROIZVODI





SERENADE® ASO

Serenade® Aso je biološki fungicid i baktericid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrčarstvu i ratarstvu.

Kultura:

vinova loza, jabuka, kruška, badem, marelica, trešnja, breskva, nektarina, šljiva, uljana repica, krumpir, šećerna repa, salata, patlidžan, rajčica, krastavac, jagoda, orah, malina, začinsko i aromatično bilje, artičoka, mrkva, ukrasno bilje, duhan i gljive

Aktivna tvar:

Bacillus amyloliquefaciens (prije subtilis), soj QST 713, 1x109 CFU/g (14,1 g/L)

Formulacija:

SC – koncentrat za suspenziju

Doza primjene:

2-8 L/ha ovisno o kulturi i namjeni

Karenca

Nije primjenjiva u navedenim kulturama.

PRIMJENA:

U vinovoj lozi: za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini od 4 L/ha, uz utrošak vode 100-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti od faze vidljivih odvojenih cvjetnih pupova do berbe (BBCH 60-89). Dozvoljene su najviše četiri primjene tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 5 dana;

U jabuki i kruški: za suzbijanje bakterijske paleži (*Erwinia amylovora*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze cvatnje do faze kada plodovi dosegnu 90 % svoje veličine (BBCH 60-79). Dozvoljeno je najviše šest primjene tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 3 dana;

U kruški: za suzbijanje smede pjegavosti kruške (*Stemphylium spp.*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze cvatnje do faze kada plodovi dosegnu 90 % svoje veličine (BBCH 60-79). Dozvoljeno je najviše šest primjene tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 3 dana;

U bademu, marelici, trešnji, breskvi, nektarini i šljivi: za suzbijanje paleži cvijeta i izboja te smede truleži plodova (*Monilinia spp.*) i bakterijske paleži (*Xanthomonas spp.*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze zatvorenih pupova do berbe (BBCH 57-89). Dozvoljeno je najviše šest primjene tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 5 dana;

U uljanoj repici: za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia spp.*) u količini od 2 L/ha uz utrošak vode 100-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti u vrijeme cvatnje (BBCH 60-69). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 5 dana;

U krumpiru: za suzbijanje bijele noge (*Rhizoctonia solani*) u količini 2,5-5 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u brazdu prije sadnje (BBCH 00). Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije;

U šećernoj repi: za suzbijanje pjegavosti lista šećerne repe (*Cercospora beticola*) u količini 2-4 L/ha uz utrošak vode 100-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze kada lišće pokriva 10 % površine do kraja sazrijevanja (BBCH 31-90). Dozvoljene su najviše četiri primjene tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 5 dana.

U salati (na otvorenom i u zaštićenom prostoru): za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*) i bijele truleži (*Sclerotinia spp.*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze tri razvijena lista do faze kada glavice dosegnu svoju uobičajenu veličinu (BBCH 13-49). Dozvoljeno je najviše šest primjene tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 5 dana. Na istoj površini dozvoljena su maksimalno dva proizvodna ciklusa. Sredstvo ima popratni učinak u suzbijanju bakterijske paleži salate (*Xanthomonas spp.*);

U salati (na otvorenom): za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia spp.*) i bijele noge (*Rhizoctonia solani*) u količini od 5 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha tretiranjem u brazdu. Sredstvo se primjenjuje prije sadnje ili presađivanja uz inkorporaciju u tlo do faze trećeg lista (BBCH 00-13). Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije;

U patlidžanu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i paprici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru): za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*), bakterijske pjegavosti (*Pseudomonas syringae*) i bakterijske paleži (*Xanthomonas spp.*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze trećeg razvijenog lista do berbe (BBCH 13-89). Dozvoljeno je najviše šest primjene tijekom vegetacije.

Najmanji razmak između primjena je 5 dana;

U rajčici (na otvorenom): za suzbijanje bakterijske pjegavosti (*Pseudomonas syringae*) i bakterijske paleži (*Xanthomonas spp.*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze trećeg razvijenog lista do berbe (BBCH 13-89). Dozvoljeno je najviše šest primjene tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 5 dana;

U rajčici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru): za suzbijanje fuzarijskog venuća (*Fusarium oxysporum*) u količini od 10 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u brazdu prije sadnje ili presađivanja (BBCH 00-13). Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije;

U rajčici (u zaštićenom prostoru): za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*), bakterijske pjegavosti (*Pseudomonas syringae*) i bakterijske paleži (*Xanthomonas spp.*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze trećeg razvijenog lista do berbe (BBCH 13-89). Dozvoljeno je najviše šest primjena tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 5 dana;

U krastavcu (u zaštićenom prostoru): za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini od 4 L/ha uz utrošak vode 200-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze trećeg razvijenog lista do berbe (BBCH 13-89). Dozvoljeno je najviše šest primjene tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 5 dana;

U jagodi (na otvorenom i u zaštićenom prostoru): za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih vidljivih cvjetova do berbe (BBCH 55-89). Dozvoljeno je najviše šest primjena tijekom vegetacije. Najmanji razmak između primjena je 5 dana.

Proširenje registracije za male namjene:*

Orah - za suzbijanje bakterijske pjegavosti (*Xanthomonas arboricola* pv. *juglandis*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija zatvorenih pupova do stadija kada je plod 50 % uobičajene veličine (BBCH 55-75). Dozvoljeno je najviše 6 primjena u vegetacijskoj sezoni s najmanjim razmakom od 3 dana između primjena. Najveća dozvoljena količina sredstva po metru visine krošnje je 2,6 L/ha, a ukupna količina ne smije preći 8 L/ha;

Malina (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), borovnica (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), kupina (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i ribiz (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) - za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*) i pepelnica (*Erysiphales*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih vidljivih cvjetova do berbe (BBCH 53-95). Dozvoljeno je najviše 6 primjena u vegetacijskoj sezoni s najmanjim razmakom od 3 dana između primjena;

Jagoda (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) - za suzbijanje pepelnice (*Podosphaera aphanis*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija prvih vidljivih cvjetova do berbe (BBCH 53-95). Dozvoljeno je najviše 6 primjena u vegetacijskoj sezoni s najmanjim razmakom od 3 dana između primjena;

Začinsko i aromatično bilje (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) - za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*), pepelnica (*Erysiphales*) i bakterijskih bolesti (*Pseudomonas spp.*, *Xanthomonas spp.*, *Erwinia spp.*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak

vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija trećeg lista do berbe (BBCH 13-89). Dozvoljeno je najviše 6 primjena u vegetacijskoj sezoni s najmanjim razmakom od 5 dana između primjena;

Artičoka (na otvorenom) - za suzbijanje bakterijske pjegavosti (*Pseudomonas cichorii*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija trećeg lista do berbe (BBCH 13-89). Dozvoljeno je najviše 6 primjena u vegetacijskoj sezoni s najmanjim razmakom od 5 dana između primjena;

Mrkva (na otvorenom) - za suzbijanje *Pythium spp.* u količini 10 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje prije sadnje (BBCH 00), u brazdu. Dozvoljena je najviše 1 primjena u vegetacijskoj sezoni;

Ukrasno bilje (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i cvijeće (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) - za suzbijanje pepelnica (*Erysiphales*) u količini 5 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od BBCH 11 do 85. Dozvoljeno je najviše 6 primjena u vegetacijskoj sezoni s najmanjim razmakom od 5 dana između primjena;

Duhan - za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) i sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini 4-8 L/ha uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje BBCH 31 do 69. Dozvoljeno je najviše 6 primjena u vegetacijskoj sezoni s najmanjim razmakom od 5 dana između primjena;

Gljive (u zaštićenom prostoru) - za suzbijanje zelene pljesni (*Trichoderma aggressivum*) tretiranjem tla/komposta u količini 40 mL/100 kg komposta uz utrošak vode 250-300 mL. Dozvoljena je najviše 1 primjena u vegetacijskoj sezoni.

*Sredstvo odobreno za primjenu u malim namjenama/kulturama. Odgovornost za primjenu sredstva sukladno odobrenju na malim kulturama/namjenama u smislu učinkovitosti i/ili fitotoksičnosti preuzima korisnik sredstva.





FLIPPER®

Flipper® je kontaktni insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju lisnih uši, štitastih uši, grinja, štitastih moljaca i tripsa u ratarstvu, voćarstvu, povrčarstvu i hortikulturi.

Aktivna tvar:

Masne kiseljne kalijeve soli, 479,8 g/L

Formulacija:

Emulzija, ulje u vodi (EW)

Doza primjene:

3-10 L/ha

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni:

Dozvoljeno je najviše pet primjena tijekom vegetacije s razmakom od najmanje 7 dana između primjena.

Karenca

Nije primjenjiva za duhan, pašnjake, cvijeće i ukrasno bilje, rasadnike i usjeve za proizvodnju sjemena, a za sve ostale usjeve osigurana je vremenom primjene

Sredstvo se primjenjuje u vrijeme pojave štetnika. Pripremljenim škropivom osigurati izravni kontakt sa štetnicima, prekrivanje svih dijelova tretiranih kultura, gornju i donju stranu lista.

PRIMJENA:

U rajčici, patlidžanu, paprici, čili paprici, pepinu, krastavcu, tikvici, dinji, lubenici i bundevi (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija vidljivih listova (BBCH 10) do stadija kotiledona (BBCH 10) do pune zrelosti plodova (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, štitastih moljaca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U bamiji (na otvorenom), u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) do pune zrelosti plodova (BBCH 89) za suzbijanje pamukove lisnih uši, štitastih moljaca, koprivine grinje, kalifornijskog i duhanovog tripsa;

U krumpiru i divljoj cikoriji (na otvorenom), u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) do stadija dozrijevanja gomolja (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, štitastih moljaca, koprivine grinje, kalifornijskog i duhanovog tripsa;

U jagodi (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) do berbe (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, štitastih moljaca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U salati, divljoj salati, endiviji, radiču, listovima maslačka, vrtnoj grbici, potočnoj čestoslavici, barici, divljoj rikoli, rikoli, povrtnoj rigi, potočarki, smedoj gorusici, listovima gorusice, špinatu, listovima cikle/blitve, matovilcu, krvari, talijanskom matovilcu i tuštu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), u količini 3-7,5 L/ha i uz utrošak vode 300-750 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) do pune zrelosti (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U grahu mahunaru, grahu bez mahuna, grašku mahunaru, grašku bez mahuna, leći i bobu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija vidljivih listova (BBCH 10) do pune zrelosti (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U mrkvi, divljoj rotkvi, celeru korjenašu, slatkom komoraču, pastrnjaku, lišću kopra, hrenu, cikli i repi (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) do pune zrelosti (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U šparogi, artičoki, kardi, rabarbari, mladicama bambusa i palminoj srčići (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), u količini 3-7,5 L/ha i uz utrošak vode 300-750 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) do pune zrelosti (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U crvenom luku, poriluku, ljutici, luku srebrencu, mladom luku, vlascu i češnjaku (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), u količini 3-7,5 L/ha i uz utrošak vode 300-750 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija vidljivih listova (BBCH 10) do pune zrelosti plodova (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U kelju pupčaru, kupusu, kineskoj raštiki, savojskom kupusu, cvjetači, brokulji, kineskoj brokulji, listovima korabe, korabi, kelju, pekinškom kupusu, rotkvama, rotvici i crnoj rotki (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), u količini 3-7,5 L/ha i uz utrošak vode 300-750 L/ha (1L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) do formiranja glavica karakterističnih za sortu i vrstu (BBCH 49) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U pamuku, soji, uljanoj repici i šećernoj repi, u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija vidljivih listova (BBCH 10) do stadija kada je 80 % tobolaca otvoreno (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U duhanu, u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) do berbe (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U jaroj zobi, sirku, jaroj raži, jaroj pšenici, jarom ječmu, lucerni i hmelju u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija vidljivih listova (BBCH 10) do pune zrelosti zrna (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U ozimoj zobi, ozimoj raži, ozimoj pšenici i ozimom ječmu, u količini 3 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija vidljivih listova (BBCH 10) do pune zrelosti zrna (BBCH 89) za smanjenje brojnosti lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U suncokretu, u količini 3-5 L/ha i uz utrošak vode 300-500 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) do pune zrelosti (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U kukuruzu, u količini 3-7,5 L/ha i uz utrošak vode 300-750 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija početka razvoja listova (BBCH 10) do pune zrelosti zrna (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U pašnjacima, u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U cvijeću, ukrasnom bilju, rasadnicima cvijeća i ukrasnog bilja (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), rasadnicima drveća, usjevima za proizvodnju sjemena u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od stadija kotiledona (BBCH 10) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje i kalifornijskog tripsa;

U jabuci, krušci, dunji, nešpuli, mušmuli i azijskoj krušci, u količini 5-10 L/ha i uz utrošak vode 500-2000 L/ha (0,5-1 L/100 L vode) od bubrenja pupova (BBCH 01) do pune zrelosti plodova (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, jabukove krvave uši, kruškine buhe, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje, crvenog voćnog pauka i kalifornijskog tripsa;

U breskvi, marelici, mirabeli, trešnji, višnji i šljivi, u količini 5-10 L/ha i uz utrošak vode 500-2000 L/ha (0,5-1 L/100 L vode) od bubrenja pupova (BBCH 01) do sekundarnog opadanja plodica (BBCH 73) za suzbijanje lisnih uši, duhanovog i cvjetnog štitastog moljca, koprivine grinje, crvenog voćnog pauka i kalifornijskog tripsa;

U naranči, mandarini, klementini, limunu, grejpu, limeti, pomelu, kumkvatu i bergamotu, u količini 5-10 L/ha i uz utrošak vode 500-2500 L/ha (0,4-1 L/100 L vode) od bubrenja pupova (BBCH 01) do pune zrelosti plodova (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, štitastih moljaca, koprivine grinje, crvenog pauka agruma, tripsa uključujući i kalifornijskog tripsa. U razdoblju od rujna do veljače sredstvo primijeniti najviše dva puta uzastopno s najvećom količinom 10 L/ha i najmanjim razmakom od 7 dana između primjena;

U maslini, u količini 5-10 L/ha i uz utrošak vode 500-2500 L/ha (0,4-1 L/100 L vode) od bubrenja pupova (BBCH 01) do pune zrelosti plodova (BBCH 89) za suzbijanje lisnih uši, maslinovog mediča, oleandrove ili bršljanove štitaste uši, štitastih uši (*Leucaspis riccae*, *Lepidosaphes ulmi*), cvjetnog štitastog moljca i resičara;

U vinovoj lozi (stolne i vinske sorte), u količini 3-10 L/ha i uz utrošak vode 300-1000 L/ha (1 L/100 L vode) od bubrenja pupova (BBCH 01) do pune zrelosti grozdova (BBCH 89) za suzbijanje kalifornijskog tripsa, koprivine grinje, crvenog voćnog pauka, lozinog zelenog cvrčka, američkog cvrčka, smokvina crvca, šljivine štitaste uši, vunaste lozine uši i lisnih uši. Na stolnim sortama nakon što se grozdici počinju spuštati (BBCH 73) utrošak škropiva ne smije biti veći od 600 L/ha.

Uvijek na vašoj strani!



Nezakoniti pesticidi ne izlažite svoje usjeve riziku



Trgovina nezakonitim i krivotvorenim pesticidima je rastući problem.
Nezakoniti pesticidi nisu ispitani ni registrirani; njihova primjena
može ozbiljno našteti vašem zdravlju, usjevu i okolišu.




Kupujte proizvode
samo od ovlaštenih
trgovaca i distributera



Izbjegavajte kupnju
jeftinih proizvoda
od nepoznatih
dobavljača



Etiketa proizvoda
mora biti
na hrvatskom jeziku



Tražite račun koji
sadrži točne podatke
o kupovini

Kupujte samo
zakonite,
registrirane
pesticide

Ako imate informacije o prodaji
nezakonitih pesticida, kontaktirajte
Ministarstvo poljoprivrede,
Sektor inspekcije u poljoprivredi.



UDRUGA PROIZVOĐAČA
IZASTUPNIKA SREDSTAVA
ZA ZAŠTITU BILJA
REPUBLIKE HRVATSKE



European
Crop Protection

Za više informacija:
www.illegalpesticides.eu
www.ecpa.eu
www.crocpa.hr



AGRONOMI NA TERENU:

Zorana Bijelić Marić	+385 99 498 5259
Marijan Crnjac	+385 98 969 9281
Ornela Cindori	+385 95 902 8995
Damir Koščak	+385 99 244 6787
Danko Žakula	+385 99 345 9646
Slaven Suk	+385 99 209 2220
Ivan Miljević	+385 98 922 6608
Majkl Kolaric	+385 99 385 9534

Katalog je informativnog karaktera, može sadržavati tiskarske pogreške. Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja na siguran način. Prije upotrebe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

IZDAO:

Bayer d.o.o.
Radnička cesta 80
Zagreb
Siječanj 2024

- +385 1 6599 999
- +385 1 6599 985
- agro.info@bayer.com
- www.cropscience.bayer.hr
- Bayer Crop Science Hrvatska



Skeniraj za
WEB stranicu

