

No. 3

Bayer
Voćarski
Dnevnik



Bayer voćarski
dnevnik

5.4.2024.

Budite prvi!

Saznajte najnovije informacije naših stručnjaka izravno s terena!



Obavijest proizvođačima trešanja i višanja!

Trešnje i višnje nalaze se u fazi cvatnje kada su najosjetljivije na zarazu uzročnikom **paleži cvjetova i rodnih izboja** (*Monilinia laxa*).

Do infekcije dolazi kroz provodni sustav biljke, a simptomi su vidljivi brzo, u cvatnji ili odmah nakon cvatnje. Cvjetovi poprimaju smeđu boju, a izboji se naglo suše i propadaju.

Vlasnicima nasada preporučujemo da prate vremensku prognozu te prije oborina obave preventivnu zaštitu od uzročnika „monilioza“, te ovisno o uvjetima za razvoj bolesti preporučuje se obaviti 2-3 tretiranja fungicidima, ovisno o dužini cvatnje.

Zaštitu od uzročnika paleži cvjetova i rodnih izboja (*Monilinia laxa*) preporučuje se obaviti preventivno, prije najavljenih oborina fungicidima Luna® Experience u dozi 0,75 L/ha.



Monilinia laxa
na višnji

Period tretiranja *Monilinia laxa*



Period tretiranja kožičavost lista

Osim kemijskih mera, primjena agrotehničkih mera poput uklanjanja „mumificiranih“ plodova, suhih i oštećenih izboja važna je kako bi smanjili infektivni potencijal tijekom vegetacijske sezone.

Po završetku cvatnje trešnja i višanja, treba obratiti pažnju na zaštitu od **uzročnika kožičavosti lista** (*Blumeriella jaapi*) i **šupljikavosti lista** (*Stigmella carpophila*).

Zdrav list osigurava razvoj zdravih plodova te nesmetanu diferencijaciju rodnih pupova za narednu sezonu, stoga je izuzetno važno osigurati kvalitetnu zaštitu od bolesti.



Kožičavost na trešnji

Kožičavost na trešnji